

附件 1

古代经典名方关键信息表（“旋覆代赭汤”等 43 首方剂） （征求意见稿）

（一）旋覆代赭汤

| 基本信息 | | 现代对应情况 | | | | | |
|------------------|--|--------|---|------|--------|--|--|
| 出处 | 处方、制法及用法 | 药味名称 | 基原及用药部位 | 炮制规格 | 折算剂量 | 用法用量 | 功能主治 |
| 《伤寒论》 （汉·张仲景） | 旋覆花三两，人参二两， 生姜五两，代赭一两， 甘草三两（炙），半夏 半升（洗），大枣十二 枚（擘）。上七味，以 水一斗，煮取六升，去 滓，再煎取三升，温服 一升，日三服。 | 旋覆花 | 菊科植物旋覆花 <i>Inula japonica</i> Thunb. 或 欧亚旋覆花 <i>Inula britannica</i> L. 的干燥头状花序 | 生品 | 41.40g | 上七味，以水 2000mL，煮取 1200mL，去药渣，再煎煮至 600mL。每次温服 200mL，日三服。 | 【功效】降逆化痰，益气和胃。 【主治】胃气亏虚，痰阻气逆证。症见胃脘痞闷或胀满，按之不痛，频频嗳气；或见纳差、呃逆、恶心，甚或呕吐。舌淡，苔白滑或腻，脉弦滑或缓。 |
| | | 人参 | 五加科植物人参 <i>Panax ginseng</i> C. A. Mey. 的干燥根和根茎 | 生品 | 27.60g | | |
| | | 生姜 | 姜科植物姜 <i>Zingiber officinale</i> Rosc. 的新鲜根茎 | 生品 | 69.00g | | |
| | | 赭石 | 氧化物类矿物刚玉族赤铁矿，主含三氧化二铁（Fe ₂ O ₃ ） | 生品 | 13.80g | | |
| | | 甘草 | 豆科植物甘草 <i>Glycyrrhiza uralensis</i> Fisch. 的干燥根和根茎 | 炒甘草 | 41.40g | | |
| | | 半夏 | 天南星科植物半夏 <i>Pinellia ternata</i> (Thunb.) Breit. 的干燥块茎 | 清半夏 | 34.50g | | |

| | | | | | | | |
|----|--|----|--|----|--------|--|--|
| | | 大枣 | 鼠李科植物枣 <i>Ziziphus jujuba</i> Mill. 的干燥成熟果实 | 生品 | 36.00g | | |
| 备注 | <p>1.据原方中煎煮法“煮取三升”“温服一升”“日三服”，可知本方每服量为煎出总量的 1/3。故本方每次的服药量为：旋覆花 13.80g，人参 9.20g，生姜 23.00g，赭石 4.60g，炒甘草 13.80g，清半夏 11.5g，大枣 12.00g。根据张仲景方剂服药法中“不必尽剂”、随证变化、灵活施用的特点，日服用次数建议 1-3 次，根据临床实际遵医嘱使用。</p> <p>上述折算剂量系依汉代度量衡直接折算，若与当今主流用量严重不符，在固定原方比例和每服量的基础上，结合安全性评价结果及临床用药实际确定日服总量。</p> <p>2.炒甘草：建议参考 2020 年版《中华人民共和国药典》中清炒法，将甘草原药材除去杂质，洗净，润透，切厚片，趁湿清炒，炒至微黄，干燥。</p> | | | | | | |

(二) 吴茱萸汤

| 基本信息 | | 现代对应情况 | | | | | |
|--------------|---|--------|---|-------|--------|--|---|
| 出处 | 处方、制法及用法 | 药味名称 | 基原及用药部位 | 炮制规格 | 折算剂量 | 用法用量 | 功能主治 |
| 《伤寒论》(汉·张仲景) | 吴茱萸一升(洗), 人参三两, 生姜六两(切), 大枣十二枚(擘)。上四味, 以水七升, 煮取二升, 去滓, 温服七合, 日三服。 | 吴茱萸 | 芸香科植物吴茱萸 <i>Euodia rutaecarpa</i> (Juss.) Benth.、石虎 <i>Euodia rutaecarpa</i> (Juss.) Benth. var. <i>officinalis</i> (Dode) Huang 或疏毛吴茱萸 <i>Euodia rutaecarpa</i> (Juss.) Benth. var. <i>bodinieri</i> (Dode) Huang 的干燥近成熟果实 | 汤洗吴茱萸 | 69.00g | 上四味, 以水1400mL, 煮取400mL, 去药渣, 温服140mL, 日三服。 | 【功效】温中补虚, 降逆止呕。 【主治】肝胃虚寒, 浊阴上逆证。症见食后泛泛欲呕, 或呕吐酸水, 或干呕, 或吐清涎冷沫, 胸满脘痛, 巅顶头痛, 畏寒肢冷, 甚则伴手足逆冷、烦躁不宁, 舌淡苔白或白腻, 脉沉细弦紧或迟而缓弱。 |
| | | 人参 | 五加科植物人参 <i>Panax ginseng</i> C. A. Mey.的干燥根和根茎 | 生品 | 41.40g | | |
| | | 生姜 | 姜科植物姜 <i>Zingiber officinale</i> Rosc.的新鲜根茎 | 生品 | 82.80g | | |
| | | 大枣 | 鼠李科植物枣 <i>Ziziphus jujuba</i> Mill.的干燥成熟果实 | 生品 | 36.00g | | |
| 备注 | <p>1.据原方中煎煮法“煮取二升, 温服七合”, 可知本方每服量约为煎出总量的 1/3。故本方每次的服药量为: 汤洗吴茱萸 23.00g, 人参 13.80g, 生姜 27.60g, 大枣 12.00g。根据张仲景方剂服药法中“不必尽剂”、随证变化、灵活施用的特点, 日服用次数建议 1-3 次, 根据临床实际遵医嘱使用。</p> <p>上述折算剂量系依汉代度量衡直接折算, 若与当今主流用量严重不符, 在固定原方比例和每服量的基础上, 结合安全性评价结果及临床用药实际确定日服总量。</p> <p>2.汤洗吴茱萸: 建议参考 2007 年版《广西壮族自治区中药饮片炮制规范》收录的“生吴茱萸”相关炮制方法, 即“除去杂质, 投入沸水中浸二分钟, 捞出, 晒干”。</p> | | | | | | |

(三) 猪苓汤

| 基本信息 | | 现代对应情况 | | | | | |
|------------------|---|--------|---|------|--------|--|---|
| 出处 | 处方、制法及用法 | 药味名称 | 基原及用药部位 | 炮制规格 | 折算剂量 | 用法用量 | 功能主治 |
| 《伤寒论》 (汉·张仲景) | 猪苓(去皮)、茯苓、泽泻、阿胶、滑石(碎)各一两。上五味,以水四升,先煮四味,取二升,去滓,内阿胶烱消,温服七合,日三服。 | 猪苓 | 多孔菌科真菌猪苓 <i>Polyporus umbellatus</i> (Pers.) Fries 除去外层黑皮的干燥菌核 | 生品 | 13.80g | 上五味,以水800mL,先煮猪苓、茯苓、泽泻、滑石四味至400mL,去药渣,内阿胶13.80g烱尽,每次温服140mL,日三服。 | 【功效】利水渗湿,清热养阴。 【主治】水热互结阴伤证。症见小便不利,发热,口渴欲饮,或心烦不寐,或咳嗽,或呕恶,或下利,舌红苔白或微黄,脉浮或细数。亦治热淋、血淋。 |
| | | 茯苓 | 多孔菌科真菌茯苓 <i>Poria cocos</i> (Schw.) Wolf 的干燥菌核 | 生品 | 13.80g | | |
| | | 泽泻 | 泽泻科植物东方泽泻 <i>Alisma orientate</i> (Sam.) Juzep. 或泽泻 <i>Alisma plantago-aquatica</i> Linn. 的干燥块茎 | 生品 | 13.80g | | |
| | | 阿胶 | 马科动物驴 <i>Equus asinus</i> L. 的干燥皮或鲜皮经煎煮、浓缩制成的固体胶 | 生品 | 13.80g | | |
| | | 滑石 | 硅酸盐类矿物滑石族滑石,主含含水硅酸镁[Mg ₃ (Si ₄ O ₁₀)(OH) ₂] | 生品 | 13.80g | | |
| 备注 | 据原方中煎煮法“取二升”“温服七合”,可知本方每服量约为煎出总量的1/3。故本方每次的服药量为:猪苓4.60g,茯苓4.60g,阿胶4.60g,泽泻4.60g,滑石4.60g,日服3次。 | | | | | | |

(四) 甘草泻心汤

| 基本信息 | | 现代对应情况 | | | | | |
|------------------|--|--------|--|------|--------|--|---|
| 出处 | 处方、制法及用法 | 药味名称 | 基原及用药部位 | 炮制规格 | 折算剂量 | 用法用量 | 功能主治 |
| 《伤寒论》 (汉·张仲景) | 甘草四两(炙), 黄芩三两, 干姜三两, 大枣十二枚(擘), 半夏半升(洗), 黄连一两。上六味, 以水一斗, 煮取六升, 去滓, 再煎取三升, 温服一升, 日三服。 | 甘草 | 豆科植物甘草 <i>Glycyrrhiza uralensis</i> Fisch.的干燥根和根茎 | 炒甘草 | 55.20g | 上七味, 以水2000mL, 煮取1200mL, 去药渣, 再浓缩至600mL, 温服200mL, 日三服。 | 【功效】益气 and 胃, 消痞止利。 【主治】胃气虚弱之痞证。症见心下痞硬而满, 下利日数十行, 水谷不化, 腹中雷鸣, 干呕, 心烦不得安, 舌质淡或红, 舌苔薄白或薄黄, 脉沉细或弦滑。亦治狐惑病。 |
| | | 黄芩 | 唇形科植物黄芩 <i>Scutellaria baicalensis</i> Georgi 的干燥根 | 生品 | 41.40g | | |
| | | 干姜 | 姜科植物姜 <i>Zingiber officinale</i> Rosc. 的干燥根茎 | 生品 | 41.40g | | |
| | | 大枣 | 鼠李科植物枣 <i>Ziziphus jujuba</i> Mill. 的干燥成熟果实 | 生品 | 36.00g | | |
| | | 半夏 | 天南星科植物半夏 <i>Pinellia ternata</i> (Thunb.) Breit. 的干燥块茎 | 清半夏 | 34.50g | | |
| | | 黄连 | 毛茛科植物黄连 <i>Coptis chinensis</i> Franch、三角叶黄连 <i>Coptis deltoidea</i> C. Y. Cheng et Hsiao、云连 <i>Coptis teeta</i> Wall. 的干燥根茎 | 生品 | 13.80g | | |
| 备注 | <p>1.据原方中煎煮法“煎取三升, 温服一升”, 可知本方每服量为煎出总量的 1/3。故本方每次的服药量为: 炒甘草 18.40g, 黄芩 13.80g, 干姜 13.80g, 大枣 12.00g, 清半夏 11.50g, 黄连 4.60g。根据张仲景方剂服药法中“不必尽剂”、随证变化、灵活施用的特点, 日服用次数建议 1-3 次, 根据临床实际遵医嘱使用。</p> <p>上述折算剂量系依汉代度量衡直接折算, 若与当今主流用量严重不符, 在固定原方比例和每服量的基础上, 结合安全性评价结果及临床用药实际确定日服总量。</p> <p>2.炒甘草: 建议参考 2020 年版《中华人民共和国药典》中清炒法, 将甘草原药材除去杂质, 洗净, 润透, 切厚片, 趁湿清炒, 炒至微黄, 干燥。</p> | | | | | | |

(五) 黄连汤

| 基本信息 | | 现代对应情况 | | | | | |
|------------------|---|--------|---|------|--------|---------------------------------------|--|
| 出处 | 处方、制法及用法 | 药味名称 | 基原及用药部位 | 炮制规格 | 折算剂量 | 用法用量 | 功能主治 |
| 《伤寒论》 (汉·张仲景) | 黄连三两，甘草三两（炙），干姜三两，桂枝三两（去皮），人参二两，半夏半升（洗），大枣十二枚（擘）。上七味，以水一斗，煮取六升，去滓，温服，昼三服夜二服。 | 黄连 | 毛茛科植物黄连 <i>Coptis chinensis</i> Franch、三角叶黄连 <i>Coptis deltoidea</i> C. Y. Cheng et Hsiao、云连 <i>Coptis teeta</i> Wall.的干燥根茎 | 生品 | 41.40g | 上七味，以水2000mL，煮取1200mL，去药渣，温服。日三服、夜二服。 | 【功效】清上温下，和胃降逆。 【主治】上热下寒证。症见胸中烦闷，腹痛，或呕吐，恶心，或肠鸣泄利，舌苔白滑，脉弦者。 |
| | | 甘草 | 豆科植物甘草 <i>Glycyrrhiza uralensis</i> Fisch.的干燥根和根茎 | 炒甘草 | 41.40g | | |
| | | 干姜 | 姜科植物姜 <i>Zingiber officinale</i> Rosc.的干燥根茎 | 生品 | 41.40g | | |
| | | 桂枝 | 樟科植物肉桂 <i>Cinnamomum cassia</i> Presl 的干燥嫩枝 | 生品 | 41.40g | | |
| | | 人参 | 五加科植物人参 <i>Panax ginseng</i> C. A. Mey.的干燥根和根茎 | 生品 | 27.60g | | |
| | | 半夏 | 天南星科植物半夏 <i>Pinellia ternata</i> (Thunb.) Breit.的干燥块茎 | 清半夏 | 34.50g | | |
| | | 大枣 | 鼠李科植物枣 <i>Ziziphus jujuba</i> Mill.的干燥成熟果实 | 生品 | 36.00g | | |
| 备注 | <p>1.据原方中煎煮法“煮取六升”“昼三夜二”，可知本方每服量为煎出总量的 1/5。故本方每次的服药量为：黄连 8.28g、炒甘草 8.28g、干姜 8.28g、桂枝 8.28g、人参 5.52g、清半夏 6.90g、大枣 7.20g。根据张仲景方剂服药法中“不必尽剂”、随证变化、灵活施用的特点，日服用次数建议 1-5 次，根据临床实际遵医嘱使用。</p> <p>上述折算剂量系依汉代度量衡直接折算，若与当今主流用量严重不符，在固定原方比例和每服量的基础上，结合安全性评价结果及临床用药实际确定日服总量。</p> <p>2.炒甘草：建议参考 2020 年版《中华人民共和国药典》中清炒法，将甘草原药材除去杂质，洗净，润透，切厚片，趁湿清炒，炒至微黄，</p> | | | | | | |

| | |
|--|-----|
| | 干燥。 |
|--|-----|

(六) 附子汤

| 基本信息 | | 现代对应情况 | | | | | |
|--------------|---|--------|---|------|--------|---|--|
| 出处 | 处方、制法及用法 | 药味名称 | 基原及用药部位 | 炮制规格 | 折算剂量 | 用法用量 | 功能主治 |
| 《伤寒论》(汉·张仲景) | 附子二枚(炮, 去皮, 破八片), 茯苓三两, 人参二两, 白术四两, 芍药三两。上五味, 以水八升, 煮取三升, 去滓, 温服一升, 日三服。 | 附子 | 毛茛科植物乌头 <i>Aconitum carmichaelii</i> Debx.子根的加工品 | 黑顺片 | 30.00g | 上五味, 以水1600mL 煎煮, 煮取 600mL, 去药渣, 温服 200mL, 日三服。 | 【功效】温经助阳, 散寒祛湿。 【主治】阳虚寒湿内停证。症见身体骨节疼痛, 手足不温, 背恶寒, 纳差, 口中和, 大便稀溏, 神疲乏力, 舌淡苔白滑, 脉沉微或细。 |
| | | 茯苓 | 多孔菌科真菌茯苓 <i>Poria cocos</i> (Schw.) Wolf 的干燥菌核 | 生品 | 41.40g | | |
| | | 人参 | 五加科植物人参 <i>Panax ginseng</i> C. A. Mey.的干燥根和根茎 | 生品 | 27.60g | | |
| | | 白术 | 菊科植物白术 <i>Atractylodes macrocephala</i> Koidz.的干燥根茎 | 生品 | 55.20g | | |
| | | 白芍 | 毛茛科植物芍药 <i>Paeonia lactiflora</i> Pall.的干燥根 | 生品 | 41.40g | | |
| 备注 | <p>据原方中煎煮法“煮取三升”“温服一升”“日三服”, 可知本方每服量为煎出总量的 1/3。故本方每次的服药量为: 黑顺片 10.00g, 茯苓 13.80g, 人参 9.20g, 白术 18.40g, 白芍 13.80g。根据张仲景方剂服药法中“不必尽剂”、随证变化、灵活施用的特点, 日服用次数建议 1-3 次, 根据临床实际遵医嘱使用。</p> <p>上述折算剂量系依汉代度量衡直接折算, 若与当今主流用量严重不符, 在固定原方比例和每服量的基础上, 结合安全性评价结果及临床用药实际确定日服总量。</p> | | | | | | |

(七) 泽泻汤

| 基本信息 | | 现代对应情况 | | | | | |
|---------------|---|--------|---|------|--------|-----------------------------|---|
| 出处 | 处方、制法及用法 | 药味名称 | 基原及用药部位 | 炮制规格 | 折算剂量 | 用法用量 | 功能主治 |
| 《金匱要略》(汉·张仲景) | 泽泻五两，白术二两。上二味，以水二升，煮取一升，分温再服。 | 泽泻 | 泽泻科植物东方泽泻 <i>Alisma orientate</i> (Sam.) Juzep.或泽泻 <i>Alisma plantago-aquatica</i> Linn.的干燥块茎 | 生品 | 69.00g | 上两味，用水400mL，煮取约200mL，分两次温服。 | 【功效】利水健脾除饮。 【主治】水饮上犯之眩晕。症见头目眩晕，胸中痞满，咳逆倚息，舌质淡胖，苔白滑，脉沉弦。 |
| | | 白术 | 菊科植物白术 <i>Atractylodes macrocephala</i> Koidz.的干燥根茎 | 生品 | 27.60g | | |
| 备注 | <p>据原方中煎煮法“煮取一升”“分温再服”，可知本方每服量为煎出总量的 1/2。故本方每次的服药量为：泽泻 34.50g、白术 13.80g，根据张仲景方剂服药法中“不必尽剂”、随证变化、灵活施用的特点，日服用次数建议 1-2 次，根据临床实际遵医嘱使用。</p> <p>上述折算剂量系依汉代度量衡直接折算，若与当今主流用量严重不符，在固定原方比例和每服量的基础上，结合安全性评价结果及临床用药实际确定日服总量。</p> | | | | | | |

(八) 橘皮竹茹汤

| 基本信息 | | 现代对应情况 | | | | | |
|-------------------|---|--------|--|------|---------|-----------------------------------|---|
| 出处 | 处方、制法及用法 | 药味名称 | 基原及用药部位 | 炮制规格 | 折算剂量 | 用法用量 | 功能主治 |
| 《金匱要略》 (汉·张仲景) | 橘皮二升，竹茹二升，大枣三十枚，生姜半斤，甘草五两，人参一两。上六味，以水一斗，煮取三升，温服一升，日三服。 | 陈皮 | 芸香科植物橘 <i>Citrus reticulata</i> Blanco 及其栽培变种的干燥成熟果皮 | 生品 | 100.00g | 上六味，以水2000mL，煮取600mL，温服200mL，日三服。 | 【功效】补虚清热，和胃降逆。 【主治】胃虚有热，胃气上逆证。症见呃逆，或干呕，或暖气。虚烦不安，少气，口干，手足心热，舌淡红或嫩红，苔少或薄白，脉虚细。 |
| | | 竹茹 | 禾本科植物淡竹 <i>Phyllostachys nigra</i> (Lodd.) Munro var. <i>henonis</i> (Mitf.) Stapf ex Rendle 的茎秆的干燥中间层 | 生品 | 30.00g | | |
| | | 大枣 | 鼠李科植物枣 <i>Ziziphus jujuba</i> Mill.的干燥成熟果实 | 生品 | 90.00g | | |
| | | 生姜 | 姜科植物姜 <i>Zingiber officinale</i> Rosc.的新鲜根茎 | 生品 | 110.00g | | |
| | | 甘草 | 豆科植物甘草 <i>Glycyrrhiza uralensis</i> Fisch.的干燥根和根茎 | 生品 | 69.00g | | |
| | | 人参 | 五加科植物人参 <i>Panax ginseng</i> C. A. Mey.的干燥根和根茎 | 生品 | 13.80g | | |
| 备注 | <p>据原方中煎煮法“煮取三升”“温服一升，日三服”，可知本方每服量为煎出总量的1/3。故本方每次的服药量为：陈皮 33.33g、竹茹 10.00g、大枣 30.00g、生姜 36.67g、甘草 23.00g、人参 4.60g。根据张仲景方剂服药法中“不必尽剂”、随证变化、灵活施用的特点，日服用次数建议 1-3 次，根据临床实际遵医嘱使用。</p> <p>上述折算剂量系依汉代度量衡直接折算，若与当今主流用量严重不符，在固定原方比例和每服量的基础上，结合安全性评价结果及临床用药实际确定日服总量。</p> | | | | | | |

(九) 甘姜苓术汤

| 基本信息 | | 现代对应情况 | | | | | |
|---------------|---|--------|---|------|--------|--|--|
| 出处 | 处方、制法及用法 | 药味名称 | 基原及用药部位 | 炮制规格 | 折算剂量 | 用法用量 | 功能主治 |
| 《金匮要略》（汉·张仲景） | 甘草、白术各二两，干姜、茯苓各四两。上四味，以水五升，煮取三升，分温三服。 | 甘草 | 豆科植物甘草 <i>Glycyrrhiza uralensis</i> Fisch.的干燥根和根茎 | 生品 | 27.60g | 上四味，先以水1000mL煎煮四味，煮取约600mL，温服约200mL，日三服。 | 【功效】散寒除湿。 【主治】寒湿下侵之肾着。症见腰部冷痛沉重，饮食如故，小便自利，舌淡苔白，脉沉迟或沉缓。 |
| | | 白术 | 菊科植物白术 <i>Atractylodes macrocephala</i> Koidz.的干燥根茎 | 生品 | 27.60g | | |
| | | 干姜 | 姜科植物姜 <i>Zingiber officinale</i> Rosc.的干燥根茎 | 生品 | 55.20g | | |
| | | 茯苓 | 多孔菌科真菌茯苓 <i>Poria cocos</i> (Schw.) Wolf 的干燥菌核 | 生品 | 55.20g | | |
| 备注 | <p>据原方中煎煮法“煮取三升”“分温三服”，可知本方每服量为煎出总量的 1/3。故本方每次的服药量为：甘草 9.20g、白术 9.20g、干姜 18.40g、茯苓 18.40g，根据张仲景方剂服药法中“不必尽剂”、随证变化、灵活施用的特点，日服用次数建议 1-3 次，根据临床实际遵医嘱使用。</p> <p>上述折算剂量系依汉代度量衡直接折算，若与当今主流用量严重不符，在固定原方比例和每服量的基础上，结合安全性评价结果及临床用药实际确定日服总量。</p> | | | | | | |

(十) 厚朴七物汤

| 基本信息 | | 现代对应情况 | | | | | |
|-------------------|---|--------|--|------|---------|-------------------------------------|---|
| 出处 | 处方、制法及用法 | 药味名称 | 基原及用药部位 | 炮制规格 | 折算剂量 | 用法用量 | 功能主治 |
| 《金匮要略》 (汉·张仲景) | 厚朴半斤，甘草、大黄各三两，大枣十枚，枳实五枚，桂枝二两，生姜五两。上七味，以水一斗，煮取四升，温服八合，日三服。 | 厚朴 | 木兰科植物厚朴 <i>Magnolia officinalis</i> Rehd. et Wils.或凹叶厚朴 <i>Magnolia officinalis</i> Rehd. et Wils. var. <i>biloba</i> Rehd. et Wils.的干燥干皮、根皮及枝皮 | 生品 | 110.00g | 上七味，以水2000mL煎煮，煮取800mL，温服160mL，日三服。 | 【功效】解肌发表，行气通便。 【主治】表虚里实证。症见腹满，便秘，发热恶寒，汗出，舌红苔薄黄，脉浮数或浮滑。 |
| | | 甘草 | 豆科植物甘草 <i>Glycyrrhiza uralensis</i> Fisch.的干燥根和根茎 | 生品 | 41.40g | | |
| | | 大黄 | 蓼科植物掌叶大黄 <i>Rheum palmatum</i> L.、唐古特大黄 <i>Rheum tanguticum</i> Maxim.ex Balf.或药用大黄 <i>Rheum officinale</i> Baill.的干燥根及根茎 | 生品 | 41.40g | | |
| | | 大枣 | 鼠李科植物枣 <i>Ziziphus jujuba</i> Mill.的干燥成熟果实 | 生品 | 30.00g | | |
| | | 枳实 | 芸香科植物酸橙 <i>Citrus aurantium</i> L.及其栽培变种的干燥幼果 | 生品 | 69.00g | | |
| | | 桂枝 | 樟科植物肉桂 <i>Cinnamomum cassia</i> Presl 的干燥嫩枝 | 生品 | 27.60g | | |
| | | 生姜 | 姜科植物姜 <i>Zingiber officinale</i> Rosc.的新鲜根茎 | 生品 | 69.00g | | |
| | | 备注 | <p>据原方中煎煮法“煮取四升”“温服八合”“日三服”，可知本方每服量为煎出总量的1/5。故本方每次的服药量为：厚朴22.00g，甘草8.28g，大黄8.28g，大枣6.00g，枳实13.80g，桂枝5.52g，生姜13.80g，根据张仲景方剂服药法中“不必尽剂”、随证变化、灵活施用的特点，日服用次数建议1-3次，根据临床实际遵医嘱使用。</p> <p>上述折算剂量系依汉代度量衡直接折算，若与当今主流用量严重不符，在固定原方比例和每服量的基础上，结合安全性评价结果及临床用</p> | | | | |

| | |
|--|------------|
| | 药实际确定日服总量。 |
|--|------------|

(十一) 温脾汤

| 基本信息 | | 现代对应情况 | | | | | |
|---------------------|---|--------|--|------|--------|---------------------------------|--|
| 出处 | 处方、制法及用法 | 药味名称 | 基原及用药部位 | 炮制规格 | 折算剂量 | 用法用量 | 功能主治 |
| 《备急千金要方》 (唐·孙思邈) | 大黄四两，人参、甘草、干姜各二两，附子一枚（大者）。右五味，咬咀，以水八升煮取二升半，分三服。临熟下大黄。 | 大黄 | 蓼科植物掌叶大黄 <i>Rheum palmatum</i> L.、唐古特大黄 <i>Rheum tanguticum</i> Maxim. ex Balf.或药用大黄 <i>Rheum officinale</i> Baill.的干燥根及根茎 | 生品 | 55.20g | 上五味，以水1600mL，临熟下大黄，煮取500mL，日三服。 | 【功效】温补脾阳，攻下冷积。 【主治】脾阳不足，阴寒内积证。症见久利赤白，或霍乱；大便不通，脐腹冷痛，喜温不喜按，肢冷，舌淡苔白，脉沉弦或迟或弱。 |
| | | 人参 | 五加科植物人参 <i>Panax ginseng</i> C. A. Mey.的干燥根和根茎 | 生品 | 27.60g | | |
| | | 甘草 | 豆科植物甘草 <i>Glycyrrhiza uralensis</i> Fisch.的干燥根和根茎 | 生品 | 27.60g | | |
| | | 干姜 | 姜科植物姜 <i>Zingiber officinale</i> Rosc.的干燥根茎 | 生品 | 27.60g | | |
| | | 附子 | 毛茛科植物乌头 <i>Aconitum carmichaelii</i> Debx.子根的加工品 | 黑顺片 | 15.00g | | |
| 备注 | <p>唐代方药计量传承了汉代的度量衡制度，服法亦参考汉代方剂处理。据原方中煎服法“煮取二升半，分三服”，可知本方每服剂量为煎出总量的1/3，故本方每次的服药量为：大黄18.40g，人参9.20g，甘草9.20g，干姜9.20g，黑顺片5.00g。日服用次数建议1-3次，根据临床实际遵医嘱使用。</p> <p>上述折算剂量系依汉代度量衡直接折算，若与当今主流用量不符，在固定原方比例和每服量的基础上，结合安全性评价结果及临床用药实际确定日服总量。</p> | | | | | | |

(十二) 竹茹汤

| 基本信息 | | 现代对应情况 | | | | | |
|----------------|---|--------|--|------|---------|---|---|
| 出处 | 处方、制法及用法 | 药味名称 | 基原及用药部位 | 炮制规格 | 折算剂量 | 用法用量 | 功能主治 |
| 《普济本事方》（宋·许叔微） | 干葛三两，甘草三分（炙），半夏三分（姜汁半盏，浆水一升煮耗半）。右粗末，每服五钱，水二盏，生姜三片，竹茹一弹大，枣一个，同煎至一盏，去滓温服。 | 葛根 | 豆科植物野葛 <i>Pueraria lobata</i> (Willd.) Ohwi 或甘葛藤 <i>Pueraria thomsonii</i> Benth.的干燥根 | 生品 | 123.90g | 上药粉碎为粗粒，每服20.65g，以水600mL，生姜3.00g，竹茹1.00g，大枣3.00g，煮取300mL，去药渣温服。 | 【功效】清热和胃止呕。 【主治】胃中积热，失于和降之呕吐。症见食入即呕，吐物酸腐，口有秽气，躁闷心烦，渴喜冷饮，舌红苔黄腻，脉洪大。 |
| | | 甘草 | 豆科植物甘草 <i>Glycyrrhiza uralensis</i> Fisch.的干燥根和根茎 | 炒甘草 | 30.98g | | |
| | | 半夏 | 天南星科植物半夏 <i>Pinellia ternata</i> (Thunb.) Breit.的干燥块茎 | 姜半夏 | 30.98g | | |
| | | 生姜 | 姜科植物姜 <i>Zingiber officinale</i> Rosc.的新鲜根茎 | 生品 | 3.00g | | |
| | | 竹茹 | 禾本科植物淡竹 <i>Phyllostachys nigra</i> (Lodd.) Munro var. <i>henonis</i> (Mitf.) Stapf ex Rendle 的茎秆的干燥中间层 | 生品 | 1.00g | | |
| | | 大枣 | 鼠李科植物枣 <i>Ziziphus jujuba</i> Mill.的干燥成熟果实 | 生品 | 3.00g | | |
| 备注 | <p>1.本方直接折算剂量并非每日服量，结合方剂组成及每服量，按日服三次计算，则本方的日服总量约为 61.95g，各药的日服量折算如下：葛根 41.30g，炒甘草 10.33g，姜半夏 10.33g，另加生姜 9.00g，竹茹 3.00g，大枣 9.00g。</p> <p>2.炒甘草：建议参考 2020 年版《中华人民共和国药典》中清炒法，将甘草原药材除去杂质，洗净，润透，切厚片，趁湿清炒，炒至微黄，干燥。</p> | | | | | | |

(十三) 辛夷散

| 基本信息 | | 现代对应情况 | | | | | |
|----------------|---|--------|---|------|-------|-------------------------|--|
| 出处 | 处方、制法及用法 | 药味名称 | 基原及用药部位 | 炮制规格 | 折算剂量 | 用法用量 | 功能主治 |
| 《严氏济生方》（宋·严用和） | 辛夷仁、细辛（洗去土、叶）、藁本（去芦）、升麻、川芎、木通（去节）、防风（去芦）、羌活（去芦）、甘草（炙）、白芷各等分。右为细末，每服二钱。食后茶清调服。 | 辛夷 | 木兰科植物望春花 <i>Magnolia biondii</i> Pamp.或玉兰 <i>Magnolia denudata</i> Desr.除去苞片的干燥花蕾 | 辛夷仁 | 0.83g | 上药粉碎为细末，每服8.26g，食后茶清调服。 | 【功效】疏散风寒，祛湿通窍。 【主治】外感风寒湿邪，清窍不利证，症见鼻内壅塞，涕出不已，或气息不通，不闻香臭，舌淡苔白，脉浮。 |
| | | 细辛 | 马兜铃科植物北细辛 <i>Asarum heterotropoides</i> Fr. Schmidt var. <i>mandshuricum</i> (Maxim.) Kitag.、汉城细辛 <i>Asarum sieboldii</i> Miq. var. <i>seoulense</i> Nakai 或华细辛 <i>Asarum sieboldii</i> Miq.的干燥根和根茎 | 生品 | 0.83g | | |
| | | 藁本 | 伞形科植物藁本 <i>Ligusticum sinense</i> Oliv.或辽藁本 <i>Ligusticum jeholense</i> Nakai et Kitag.的干燥根 | 生品 | 0.83g | | |
| | | 升麻 | 毛茛科升麻属植物大三叶升麻 <i>Cimicifuga heracleifolia</i> Kom.、兴安升麻 <i>Cimicifuga dahurica</i> (Turcz.) Maxim.或升麻 <i>Cimicifuga foetida</i> L.的干燥根茎 | 生品 | 0.83g | | |
| | | 川芎 | 伞形科植物川芎 <i>Ligusticum chuanxiong</i> Hort.的干燥根茎 | 生品 | 0.83g | | |
| | | 木通 | 木通科植物木通 <i>Akebia quinata</i> (Thunb.) Decne.、三叶木通 <i>Akebia trifoliata</i> (Thunb.) Koidz.、白木通 <i>Akebia trifoliata</i> (Thunb.) Koidz. var. <i>australis</i> (Diels) Rehd.的干燥藤茎 | 生品 | 0.83g | | |
| | | 防风 | 伞形科植物防风 <i>Saposhnikovia divaricata</i> (Turcz.) Schischk.的干燥根 | 生品 | 0.83g | | |
| | | 羌活 | 伞形科植物羌活 <i>Notopterygium incisum</i> Ting ex H. T. Chang 的干燥根茎和根 | 生品 | 0.83g | | |

| | | | | | | | |
|----|--|----|--|-----|-------|--|--|
| | | 甘草 | 豆科植物甘草 <i>Glycyrrhiza uralensis</i> Fisch.的干燥根和根茎 | 炒甘草 | 0.83g | | |
| | | 白芷 | 伞形科植物白芷 <i>Angelica dahurica</i> (Fisch. ex Hoffm.) Benth. et Hook. f.或杭白芷 <i>Angelica dahurica</i> (Fisch. ex Hoffm.) Benth. et Hook. f. var. <i>formosana</i> (Boiss.) Shan et Yuan 的干燥根 | 生品 | 0.83g | | |
| 备注 | <p>1.本方组成中并未明确说明用量，结合方剂组成及每服量，按日服三次计算，则本方的日服总量为 24.78g。各药的日服量可折算如下：辛夷仁 2.49g，细辛 2.49g，藁本 2.49g，升麻 2.49g，川芎 2.49g，木通 2.49g，防风 2.49g，羌活 2.49g，炒甘草 2.49g，白芷 2.49g。</p> <p>2.辛夷仁：除去外层带毛苞片。</p> <p>3.炒甘草：建议参考 2020 年版《中华人民共和国药典》中清炒法，将甘草原药材除去杂质，洗净，润透，切厚片，趁湿清炒，炒至微黄，干燥。</p> <p>4.鉴于古代长期推崇四川等地所产升麻 <i>Cimicifuga foetida</i> L.，建议人工栽培优先选择该基原。</p> <p>5.取茶叶用沸水第一次冲泡澄清数分钟后的清汁调服</p> | | | | | | |

(十四) 实脾散

| 基本信息 | | 现代对应情况 | | | | | |
|----------------|--|--------|---|------|--------|--|--|
| 出处 | 处方、制法及用法 | 药味名称 | 基原及用药部位 | 炮制规格 | 折算剂量 | 用法用量 | 功能主治 |
| 《严氏济生方》（宋·严用和） | 厚朴（去皮，姜制，炒）、白朮、木瓜（去瓢）、木香（不见火）、草果仁、大腹子、附子（炮、去皮脐）、白茯苓（去皮）、干姜（炮）各一两，甘草（炙）半两。右咬咀，每服四钱，水一盏半，生姜五片，枣子一枚，煎至七分，去滓温服，不拘时候。 | 厚朴 | 木兰科植物厚朴 <i>Magnolia officinalis</i> Rehd. et Wils.或凹叶厚朴 <i>Magnolia officinalis</i> Rehd. et Wils. var. <i>biloba</i> Rehd. et Wils.的干燥干皮、根皮及枝皮 | 姜厚朴 | 41.30g | 上药粉碎成粗粒，每服16.52g，以水450mL，加入生姜5.00g，大枣3.00g，煮取210mL，去药渣温服，不拘时候。 | 【功效】温阳健脾，行气利水。 【主治】脾肾阳虚，水气内停之阴水证。症见肢体浮肿，下半身肿甚，手足不温，口中不渴，胸腹胀满，大便溏薄，小便少而清，舌苔白腻，脉沉弦而迟。 |
| | | 白朮 | 菊科植物白朮 <i>Atractylodes macrocephala</i> Koidz.的干燥根茎 | 生品 | 41.30g | | |
| | | 木瓜 | 蔷薇科植物贴梗海棠 <i>Chaenomeles speciosa</i> (Sweet) Nakai 的干燥近成熟果实 | 生品 | 41.30g | | |
| | | 木香 | 菊科植物木香 <i>Aucklandia lappa</i> Decne.的干燥根 | 生品 | 41.30g | | |
| | | 草果 | 姜科植物草果 <i>Amomum tsao-ko</i> Crevost et Lemaire 的干燥成熟果实 | 草果仁 | 41.30g | | |
| | | 槟榔 | 棕榈科植物槟榔 <i>Areca catechu</i> L.的干燥成熟种子 | 生品 | 41.30g | | |
| | | 附子 | 毛茛科植物乌头 <i>Aconitum carmichaelii</i> Debx.子根的加工品 | 黑顺片 | 41.30g | | |
| | | 茯苓 | 多孔菌科真菌茯苓 <i>Poria cocos</i> (Schw.) Wolf 的白色干燥菌核 | 生品 | 41.30g | | |
| | | 炮姜 | 姜科植物姜 <i>Zingiber officinale</i> Rosc.干燥根茎的炮制加工品 | 炮姜 | 41.30g | | |
| | | 甘草 | 豆科植物甘草 <i>Glycyrrhiza uralensis</i> Fisch.的干 | 炒甘草 | 20.65g | | |

| | | | | | | | |
|----|---|----|---|----|-------|--|--|
| | | | 燥根和根茎 | | | | |
| | | 生姜 | 姜科植物姜 <i>Zingiber officinale</i> Rosc.的新鲜根茎 | 生品 | 5.00g | | |
| | | 大枣 | 鼠李科植物枣 <i>Ziziphus jujuba</i> Mill.的干燥成熟果实 | 生品 | 3.00g | | |
| 备注 | <p>1.本方直接折算剂量并非每日服量，结合方剂组成及每服量，按日服三次计算，则本方的日服总量约为49.56g，各药的日服量折算如下：姜厚朴5.22g，白术5.22g，木瓜5.22g，木香5.22g，草果5.22g，槟榔5.22g，黑顺片5.22g，茯苓5.22g，干姜5.22g，炒甘草2.61g，另加生姜15.00g，大枣9.00g。</p> <p>2.炒甘草：建议参考2020年版《中华人民共和国药典》中清炒法，将甘草原药材除去杂质，洗净，润透，切厚片，趁湿清炒，炒至微黄，干燥。</p> | | | | | | |

(十五) 甘露饮

| 基本信息 | | 现代对应情况 | | | | | |
|---------------------------|--|--------|---|---------|-------|--|--|
| 出处 | 处方、制法及用法 | 药味名称 | 基原及用药部位 | 炮制规格 | 折算剂量 | 用法用量 | 功能主治 |
| 《太平惠民和剂局方》 (宋·太平惠民和剂局) | 枇杷叶(刷去毛)、干熟地黄(去土)、天门冬(去心,焙)、枳壳(去瓢,麸炒)、山茵陈(去梗)、生干地黄、麦门冬(去心,焙)、石斛(去芦)、甘草(炙)、黄芩。右等分,为末。每服二钱,水一盏,煎至七分,去滓温服,食后,临卧。小儿一服分两服,仍量岁数加减与之。 | 枇杷叶 | 蔷薇科植物枇杷 <i>Eriobotrya japonica</i> (Thunb.) Lindl.的干燥叶 | 生品 | 0.83g | 上药粉碎为末,每服8.26g,以水300mL,煮取210mL,去药渣,饭后、睡前温服。小儿用量减半。 | 【功效】滋阴清热,利湿降气。 【主治】胃热阴虚,脾胃湿热证。症见牙宣口臭,口舌生疮,齿龈肿烂,甚则脓血;或赤目肿痛,咽喉肿痛,面肿,目眦垂重;或身面皆黄,肢体微肿,胸满气短,大便不调,小便黄涩;舌红或绛,苔黄腻或有裂纹,脉濡数或细数。 |
| | | 熟地黄 | 玄参科植物地黄 <i>Rehmannia glutinosa</i> Libosch.的干燥块根的炮制加工品 | 熟地黄(蒸法) | 0.83g | | |
| | | 天冬 | 百合科植物天冬 <i>Asparagus cochinchinensis</i> (Lour.) Merr.的干燥块根 | 天冬(焙) | 0.83g | | |
| | | 枳壳 | 芸香科植物酸橙 <i>Citrus aurantium</i> L.及其栽培变种的干燥未成熟果实 | 麸炒枳壳 | 0.83g | | |
| | | 茵陈 | 菊科植物滨蒿 <i>Artemisia scoparia</i> Waldst. et Kit.或茵陈蒿 <i>Artemisia capillaris</i> Thunb.的干燥地上部分 | 生品 | 0.83g | | |
| | | 地黄 | 玄参科植物地黄 <i>Rehmannia glutinosa</i> Libosch.的干燥块根 | 生品 | 0.83g | | |
| | | 麦冬 | 百合科植物麦冬 <i>Ophiopogon japonicus</i> (L.f) Ker-Gawl.的干燥块根 | 麦冬(焙) | 0.83g | | |
| | | 石斛 | 兰科植物铁皮石斛 <i>Dendrobium officinale</i> Kimura et Migo 或霍山石斛 <i>Dendrobium huoshanense</i> C. Z. Tang et S. J. Cheng 的干燥茎 | 生品 | 0.83g | | |

| | | | | | | | |
|----|--|----|---|-----|-------|--|--|
| | | 甘草 | 豆科植物甘草 <i>Glycyrrhiza uralensis</i> Fisch.的干燥根和根茎 | 炒甘草 | 0.83g | | |
| | | 黄芩 | 唇形科植物黄芩 <i>Scutellaria baicalensis</i> Georgi的干燥根 | 生品 | 0.83g | | |
| 备注 | <p>1.本方直接折算剂量并非每日服量，结合方剂组成及每服量，按日服三次计算，则本方的日服总量约为 24.78g，各药的日服量折算如下：枇杷叶 2.49g，熟地黄 2.49g，天冬 2.49g，枳壳 2.49g，茵陈 2.49g，地黄 2.49g，麦冬 2.49g，石斛 2.49g，炒甘草 2.49g，黄芩 2.49g。儿童用量减半。</p> <p>2.炒甘草：建议参考 2020 年版《中华人民共和国药典》中清炒法，将甘草原药材除去杂质，洗净，润透，切厚片，趁湿清炒，炒至微黄，干燥。</p> <p>3.麦冬传统去心，为历代所沿用，延续至今，如 1963 年版《中华人民共和国药典》麦冬炮制项内明确“润透后抽去心”，自 1977 年版《中华人民共和国药典》起不再要求去心。当前麦冬不同产地生产方式有较大区别，不同栽培年限所致性状、气味及内在成分含量均有差异，品质差异较大，栽培年限过短者中柱细小，有鉴于此，建议参考 2015 年版《浙江省中药炮制规范》所规定的浙麦冬饮片规格入药。</p> <p>4.本方中天冬、麦冬注明焙的操作，其目的为使药材质地酥脆，便于后续粉碎，因此建议尊重原方炮制方法，可参考 2005 年版《安徽省中药炮制规范》中的焙法进行炮制。</p> | | | | | | |

(十六) 华盖散

| 基本信息 | | 现代对应情况 | | | | | |
|-----------------------|---|--------|---|------|--------|---|--|
| 出处 | 处方、制法及用法 | 药味名称 | 基原及用药部位 | 炮制规格 | 折算剂量 | 用法用量 | 功能主治 |
| 《太平惠民和剂局方》（宋·太平惠民和剂局） | 紫苏子（炒）、赤茯苓（去皮）、桑白皮（炙）、陈皮（去白）、杏仁（去皮、尖，炒）、麻黄（去根、节）各一两，甘草（炙）半两。右七味为末。每服二钱，水一盏，煎至七分，去滓，食后温服。 | 紫苏子 | 唇形科植物紫苏 <i>Perilla frutescens</i> (L.) Britt. 的干燥成熟果实 | 炒紫苏子 | 41.30g | 上药粉碎为末。每服 8.26g，以水 300mL，煮取 210mL，去药渣，饭后温服。 | 【功效】宣肺解表，祛痰止咳。 【主治】素体痰多，风寒袭肺证。症见咳嗽气急，甚则喘促，喉中痰鸣，胸膈满闷，项背拘急，鼻塞声重，头昏目眩。舌苔薄白，脉浮或紧。 |
| | | 赤茯苓 | 多孔菌科真菌茯苓 <i>Poria cocos</i> (Schw.) Wolf 淡棕色、淡红色的干燥菌核 | 生品 | 41.30g | | |
| | | 桑白皮 | 桑科植物桑 <i>Morus alba</i> L. 的干燥根皮 | 炙桑白皮 | 41.30g | | |
| | | 橘红 | 芸香科植物橘 <i>Citrus reticulata</i> Blanco 及其栽培变种的干燥外层果皮 | 生品 | 41.30g | | |
| | | 苦杏仁 | 蔷薇科植物杏 <i>Prunus armeniaca</i> L. 的干燥成熟种子 | 炒苦杏仁 | 41.30g | | |
| | | 麻黄 | 麻黄科植物草麻黄 <i>Ephedra sinica</i> Stapf 的干燥草质茎 | 生品 | 41.30g | | |
| | | 甘草 | 豆科植物甘草 <i>Glycyrrhiza uralensis</i> Fisch. 的干燥根和根茎 | 炒甘草 | 20.65g | | |
| 备注 | <p>1.本方直接折算剂量并非每日服量，结合方剂组成及每服量，按日服三次计算，则本方的日服总量约为 24.78g，各药的日服量折算如下：炒紫苏子 3.81g，赤茯苓 3.81g，炙桑白皮 3.81g，橘红 3.81g，炒苦杏仁 3.81g，麻黄 3.81g，炒甘草 1.91g。</p> <p>2.炒甘草：建议参考 2020 年版《中华人民共和国药典》中清炒法，将甘草原药材除去杂质，洗净，润透，切厚片，趁湿清炒，炒至微黄，干燥。</p> <p>3.炙桑白皮：《太平惠民和剂局方》中桑白皮炮制备注有炒、微炒、蜜炒、炙等多种表述，可见炒与炙不同，古代“炙”早期多指火上烤之意，后发展成为液体辅料如蜜、酒、醋、盐水、姜汁、竹沥等处理后拌炒，其中不注明具体何种辅料的则多为清水，如明代炙甘草即明确为清</p> | | | | | | |

| | |
|--|--|
| | <p>水蘸炒，有鉴于此，建议参考 2020 年版《中华人民共和国药典》中清炒法，将桑白皮原药材除去杂质，洗净，润透，切丝，趁湿清炒，炒至微黄，干燥。</p> |
|--|--|

(十七) 三痹汤

| 基本信息 | | 现代对应情况 | | | | | |
|---------------------------------|---|--------|--|------|--------|---|--|
| 出处 | 处方、制法及用法 | 药味名称 | 基原及用药部位 | 炮制规格 | 折算剂量 | 用法用量 | 功能主治 |
| 《妇人 大全良 方》（ 宋·陈自 明） | 川续断、杜仲(去皮，切，姜汁炒)、防风、桂心、细辛、人参、茯苓、当归、白芍药、甘草各一两，秦艽、生地黄、川芎、川独活各半两，黄芪、川牛膝各一两。右咬咀为末，每服五钱。水二盏，姜三片，枣一枚，煎至一盏，去滓热服，无时候，但腹稍空服。 | 续断 | 川续断科植物川续断 <i>Dipsacus asper</i> Wall. ex Henry 的干燥根 | 生品 | 41.30g | 上药粉碎为粗粒，每服20.65g，以水600mL，生姜3.00g，大枣3.00g，煮取300mL，去药渣热服，无时候，但腹稍空服。 | 【功效】益气活血，祛风除湿。 【主治】痹症日久耗伤气血证。症见手足拘挛，或肢节屈伸不利，或麻木不仁，舌淡苔白，脉细或脉涩。 |
| | | 杜仲 | 杜仲科植物杜仲 <i>Eucommia ulmoides</i> Oliv. 的干燥树皮 | 姜杜仲 | 41.30g | | |
| | | 防风 | 伞形科植物防风 <i>Saposhnikovia divaricata</i> (Turcz.) Schischk. 的干燥根 | 生品 | 41.30g | | |
| | | 肉桂 | 樟科植物肉桂 <i>Cinnamomum cassia</i> Presl 的干燥树皮 | 生品 | 41.30g | | |
| | | 细辛 | 马兜铃科植物北细辛 <i>Asarum heterotropoides</i> Fr. Schmidt var. <i>mandshuricum</i> (Maxim.) Kitag.、汉城细辛 <i>Asarum sieboldii</i> Miq. var. <i>seoulense</i> Nakai 或华细辛 <i>Asarum sieboldii</i> Miq. 的干燥根和根茎 | 生品 | 41.30g | | |
| | | 人参 | 五加科植物人参 <i>Panax ginseng</i> C. A. Mey. 的干燥根和根茎 | 生品 | 41.30g | | |
| | | 茯苓 | 多孔菌科真菌茯苓 <i>Poria cocos</i> (Schw.) Wolf 的干燥菌核 | 生品 | 41.30g | | |
| | | 当归 | 伞形科植物当归 <i>Angelica sinensis</i> (Oliv.) Diels 的干燥根 | 酒当归 | 41.30g | | |
| | | 白芍 | 毛茛科植物芍药 <i>Paeonia lactiflora</i> Pall. 的干燥根 | 生品 | 41.30g | | |

| | | | | | | | |
|----|--|----|---|------|--------|--|--|
| | | 甘草 | 豆科植物甘草 <i>Glycyrrhiza uralensis</i> Fisch.的干燥根和根茎 | 炒甘草 | 41.30g | | |
| | | 秦艽 | 龙胆科植物秦艽 <i>Gentiana macrophylla</i> Pall.的干燥根 | 生品 | 20.65g | | |
| | | 地黄 | 玄参科植物地黄 <i>Rehmannia glutinosa</i> Libosch.的干燥块根 | 生品 | 20.65g | | |
| | | 川芎 | 伞形科植物川芎 <i>Ligusticum chuanxiong</i> Hort.的干燥根茎 | 生品 | 20.65g | | |
| | | 独活 | 伞形科植物重齿毛当归 <i>Angelica pubescens</i> Maxim. f. <i>biserrata</i> Shan et Yuan 的干燥根 | 生品 | 20.65g | | |
| | | 黄芪 | 豆科植物蒙古黄芪 <i>Astragalus membranaceus</i> (Fisch.) Bge. var. <i>mongholicus</i> (Bge.) Hsiao 或膜荚黄芪 <i>Astragalus membranaceus</i> (Fisch.) Bge.的干燥根 | 蜜炙黄芪 | 41.30g | | |
| | | 牛膝 | 苋科植物牛膝 <i>Achyranthes bidentata</i> Bl.的干燥根 | 酒牛膝 | 41.30g | | |
| | | 生姜 | 姜科植物姜 <i>Zingiber officinale</i> Rosc.的新鲜根茎 | 生品 | 3.00g | | |
| | | 大枣 | 鼠李科植物枣 <i>Ziziphus jujuba</i> Mill.的干燥成熟果实 | 生品 | 3.00g | | |
| 备注 | <p>1. 本方直接折算剂量并非每日服量，结合方剂组成及每服量，按日服三次计算，则本方的日服总量约为 61.95g，各药的日服量折算如下：续断 4.43g，姜杜仲 4.43g，防风 4.43g，肉桂 4.43g，细辛 4.43g，人参 4.43g，茯苓 4.43g，酒当归 4.43g，白芍 4.43g，炒甘草 4.43g，秦艽 2.21g，地黄 2.21g，川芎 2.21g，独活 2.21g，蜜炙黄芪 4.43g，酒牛膝 4.43g，另加生姜 9.00g，大枣 9.00g。</p> <p>2. 鉴于《妇人大全良方》卷首之“辨识修制药物法度”总论性章节中提及诸多药物的炮制，涉及本方中当归：建议参考 2020 年版《中华人民共和国药典》酒当归炮制规格；牛膝：建议参考 2020 年版《中华人民共和国药典》酒牛膝炮制规格；甘草：建议参考 2020 年版《中华人民共和国药典》中清炒法，将甘草原药材除去杂质，洗净，润透，切厚片，趁湿清炒，炒至微黄，干燥；黄芪：建议采用 2020 年版《中华人民共和国药典》炙黄芪（即蜜炙黄芪）规格；杜仲：建议参考 2020 年版《中华人民共和国药典》炙法中的姜炙法进行炮制。</p> | | | | | | |

(十八) 清胃散

| 基本信息 | | 现代对应情况 | | | | | |
|-------------------|---|--------|--|------|-------|---|--|
| 出处 | 处方、制法及用法 | 药味名称 | 基原及用药部位 | 炮制规格 | 折算剂量 | 用法用量 | 功能主治 |
| 《兰室秘藏》 (金·李东垣) | 当归身、择细黄连、生地黄(酒制)各三分,牡丹皮五分,升麻一钱。上为细末,都作一服,水一盏半,煎至一盏,去滓,带冷服之。 | 当归 | 伞形科植物当归 <i>Angelica sinensis</i> (Oliv.) Diels 的干燥根 | 生品 | 1.24g | 上药粉碎为细末,每服9.92g,以水450mL,煮取300mL,去药渣,冷服。 | 【功效】清胃凉血。 【主治】胃火炽盛之牙痛。症见牙痛牵引头痛,面颊发热,牙齿喜冷恶热,或牙宣出血,牙龈红肿溃烂,或唇舌颊腮肿痛,或口臭,口疮,口干舌燥,舌红苔黄,脉滑数。 |
| | | 黄连 | 毛茛科植物黄连 <i>Coptis chinensis</i> Franch、三角叶黄连 <i>Coptis deltoidea</i> C. Y. Cheng et Hsiao、云连 <i>Coptis teeta</i> Wall.的干燥根茎 | 生品 | 1.24g | | |
| | | 地黄 | 玄参科植物地黄 <i>Rehmannia glutinosa</i> Libosch.的干燥块根 | 酒生地 | 1.24g | | |
| | | 牡丹皮 | 毛茛科植物牡丹 <i>Paeonia suffruticosa</i> Andr.的干燥根皮 | 生品 | 2.07g | | |
| | | 升麻 | 毛茛科升麻属植物大三叶升麻 <i>Cimicifuga heracleifolia</i> Kom、兴安升麻 <i>Cimicifuga dahurica</i> (Turcz.) Maxim.或升麻 <i>Cimicifuga foetida</i> L.的干燥根茎 | 生品 | 4.13g | | |
| 备注 | <p>1.本方直接折算剂量并非每日服量,结合方剂组成及每服量,按日服三次计算,则本方的日服总量约为29.76g,各药的日服量折算如下:当归3.72g、黄连3.72g、酒生地3.72g,牡丹皮6.21g,升麻12.39g。</p> <p>2.酒生地:建议参考2020年版《中华人民共和国药典》酒炙法进行炮制。</p> <p>3.鉴于古代长期推崇四川等地所产升麻 <i>Cimicifuga foetida</i> L.,建议人工栽培优先选择该基原。</p> | | | | | | |

(十九) 圣愈汤

| 基本信息 | | 现代对应情况 | | | | | |
|---------------|--|--------|--|---------|-------|---|---|
| 出处 | 处方、制法及用法 | 药味名称 | 基原及用药部位 | 炮制规格 | 折算剂量 | 用法用量 | 功能主治 |
| 《兰室秘藏》(金·李东垣) | 生地黄、熟地黄、川芎、人参各三分，当归身、黄芪各五分。上咬咀，如麻豆大，都作一服。水二大盏，煎至一盏，去滓，稍热无时服。 | 地黄 | 玄参科植物地黄 <i>Rehmannia glutinosa</i> Libosch.的干燥块根 | 生品 | 1.24g | 上药粉碎成粗粒，每服9.10g，以水1200mL，煮取300mL，去药渣，稍热无时服。 | 【功效】补气养血。 【主治】气血亏虚证。症见心烦，睡卧不宁，或妇女月经先期而至，量多色淡，神疲乏力，面色无华，舌淡，苔薄白，脉细弱。 |
| | | 熟地黄 | 玄参科植物地黄 <i>Rehmannia glutinosa</i> Libosch.的干燥块根的炮制加工品 | 熟地黄(蒸法) | 1.24g | | |
| | | 川芎 | 伞形科植物川芎 <i>Ligusticum chuanxiong</i> Hort.的干燥根茎 | 生品 | 1.24g | | |
| | | 人参 | 五加科植物人参 <i>Panax ginseng</i> C. A. Mey.的干燥根和根茎 | 生品 | 1.24g | | |
| | | 当归 | 伞形科植物当归 <i>Angelica sinensis</i> (Oliv.)Diels 的干燥主根 | 生品 | 2.07g | | |
| | | 黄芪 | 豆科植物蒙古黄芪 <i>Astragalus membranaceus</i> (Fisch.) Bge. var. <i>mongholicus</i> (Bge.) Hsiao 或膜荚黄芪 <i>Astragalus membranaceus</i> (Fisch.) Bge. 的干燥根 | 生品 | 2.07g | | |
| 备注 | 本方直接折算剂量并非每日服量，结合方剂组成及每服量，按日服三次计算，则本方的日服总量约为27.30g，各药的日服量折算如下：生地黄3.72g，熟地黄3.72g，川芎3.72g，人参3.72g，当归6.21g、黄芪6.21g。 | | | | | | |

(二十) 乌药汤

| 基本信息 | | 现代对应情况 | | | | | |
|---------------|--|--------|--|------|--------|---|--|
| 出处 | 处方、制法及用法 | 药味名称 | 基原及用药部位 | 炮制规格 | 折算剂量 | 用法用量 | 功能主治 |
| 《兰室秘藏》(金·李东垣) | 当归、甘草、木香各五钱，乌药一两，香附子二两(炒)。上咬咀，每服五钱，水二大盏，去滓，温服，食前。 | 当归 | 伞形科植物当归 <i>Angelica sinensis</i> (Oliv.) Diels 的干燥根 | 生品 | 20.65g | 上药粉碎为粗粒，每服20.65g，以水1200mL，煮取300mL，去药渣，饭前温服。 | 【功效】行气疏肝，调经止痛。 【主治】肝郁气滞之痛经。症见经前及经期时小腹胀痛，胀甚于痛，或连及胸胁、乳房胀痛；或经期延后，舌淡红，苔薄白，脉弦。 |
| | | 甘草 | 豆科植物甘草 <i>Glycyrrhiza uralensis</i> Fisch.的干燥根和根茎 | 生品 | 20.65g | | |
| | | 木香 | 菊科植物木香 <i>Aucklandia lappa</i> Decne.的干燥根 | 生品 | 20.65g | | |
| | | 乌药 | 樟科植物乌药 <i>Lindera aggregata</i> (Sims) Kosterm.的干燥块根 | 生品 | 41.30g | | |
| | | 香附 | 莎草科植物莎草 <i>Cyperus rotundus</i> L.的干燥根茎 | 炒香附 | 82.60g | | |
| 备注 | <p>1.本方直接折算剂量并非每日服量，结合方剂组成及每服量，按日服三次计算，则本方的日服总量约为 61.95g，各药的日服量折算如下：当归 6.88g，甘草 6.88g，木香 6.88g，乌药 13.77g，炒香附 27.54g。</p> <p>2.炒香附：参考 2020 年版《中华人民共和国药典》清炒法进行炮制。</p> <p>3.本方未注明煎煮剩余水量，参考圣愈汤将剩余水量定为一盏，即 300mL。</p> | | | | | | |

(二十一) 大秦芫汤

| 基本信息 | | 现代对应情况 | | | | | |
|------------------------|--|--------|---|------|---------|-------------------------------|--|
| 出处 | 处方、制法及用法 | 药味名称 | 基原及用药部位 | 炮制规格 | 折算剂量 | 用法用量 | 功能主治 |
| 《素问病机气宜保命集》 (金·刘完素) | 秦芫三两，甘草二两，川芎二两，当归二两，白芍药二两，细辛半两，川羌活、防风、黄芩各一两，石膏二两，吴白芷一两，白术一两，生地黄一两，熟地黄一两，白茯苓一两，川独活二两。右十六味，剉，每服一两，水煎，去渣，温服，无时。 | 秦芫 | 龙胆科植物秦芫 <i>Gentiana macrophylla</i> Pall.的干燥根 | 生品 | 123.90g | 上药粉碎成粗粒，每服41.30g，水煎，去渣，温服，无时。 | 【功效】祛风清热，养血活血。 【主治】风邪初中经络证。症见口眼喎斜，舌强不能言语，手足不能运动，或半身不遂，肢体麻木，苔白或黄，脉浮数或弦细。 |
| | | 甘草 | 豆科植物甘草 <i>Glycyrrhiza uralensis</i> Fisch.的干燥根和根茎 | 生品 | 82.60g | | |
| | | 川芎 | 伞形科植物川芎 <i>Ligusticum chuanxiong</i> Hort.的干燥根茎 | 生品 | 82.60g | | |
| | | 当归 | 伞形科植物当归 <i>Angelica sinensis</i> (Oliv.) Diels 的干燥根 | 生品 | 82.60g | | |
| | | 白芍 | 毛茛科植物芍药 <i>Paeonia lactiflora</i> Pall.的干燥根 | 生品 | 82.60g | | |
| | | 细辛 | 马兜铃科植物北细辛 <i>Asarum heterotropoides</i> Fr. Schmidt var. <i>mandshuricum</i> (Maxim.) Kitag.、汉城细辛 <i>Asarum sieboldii</i> Miq. var. <i>seoulense</i> Nakai 或华细辛 <i>Asarum sieboldii</i> Miq.的干燥根和根茎 | 生品 | 20.62g | | |
| | | 羌活 | 伞形科植物羌活 <i>Notopterygium incisum</i> Ting ex H. T. Chang 的干燥根茎和根 | 生品 | 41.30g | | |
| | | 防风 | 伞形科植物防风 <i>Saposhnikovia divaricata</i> (Turcz.) Schischk.的干燥根 | 生品 | 41.30g | | |

| | | | | | | | |
|----|--|-----|--|-------------|--------|--|--|
| | | 黄芩 | 唇形科植物黄芩 <i>Scutellaria baicalensis</i> Georgi 的干燥根 | 生品 | 41.30g | | |
| | | 石膏 | 硫酸盐类矿物石膏族石膏，主含含水硫酸钙 (CaSO ₄ ·2H ₂ O) | 生品 | 82.60g | | |
| | | 白芷 | 伞形科植物杭白芷 <i>Angelica dahurica</i> (Fisch. ex Hoffm.) Benth. et Hook. f. var. <i>formosana</i> (Boiss.) Shan et Yuan 的干燥根 | 生品 | 41.30g | | |
| | | 白术 | 菊科植物白术 <i>Atractylodes macrocephala</i> Koidz. 的干燥根茎 | 生品 | 41.30g | | |
| | | 地黄 | 玄参科植物地黄 <i>Rehmannia glutinosa</i> Libosch. 的干燥块根 | 生品 | 41.30g | | |
| | | 熟地黄 | 玄参科植物地黄 <i>Rehmannia glutinosa</i> Libosch. 的干燥块根的炮制加工品 | 熟地黄 (蒸法) | 41.30g | | |
| | | 茯苓 | 多孔菌科真菌茯苓 <i>Poria cocos</i> (Schw.) Wolf 的白色干燥菌核 | 生品 | 41.30g | | |
| | | 独活 | 伞形科植物重齿毛当归 <i>Angelica pubescens</i> Maxim.f. <i>biserrata</i> Shan et Yuan 的干燥根 | 生品 | 82.60g | | |
| 备注 | 本方直接折算剂量并非每日服量，结合方剂组成及每服量，按日服三次计算，则本方的日服总量约为 123.90g，各药的日服量折算如下：秦艽 15.82g，甘草 10.54g，川芎 10.54g，当归 10.54g，白芍 10.54g，细辛 2.64g，羌活 5.27g、防风 5.27g、黄芩 5.27g，石膏 10.54g，白芷 5.27g，白术 5.27g，地黄 5.27g，熟地黄 5.27g，茯苓 5.27g，独活 10.54g。 | | | | | | |

(二十二) 三化汤

| 基本信息 | | 现代对应情况 | | | | | |
|--------------------|--|--------|---|------|--------|--|--|
| 出处 | 处方、制法及用法 | 药味名称 | 基原及用药部位 | 炮制规格 | 折算剂量 | 用法用量 | 功能主治 |
| 《素问病机气宜保命集》(金•刘完素) | 厚朴、大黄、枳实、羌活各等分。右剉如麻豆大，每服三两，水三升，煎至一升半，终日服之。以微利为度，无时。 | 厚朴 | 木兰科植物厚朴 <i>Magnolia officinalis</i> Rehd. et Wils.或凹叶厚朴 <i>Magnolia officinalis</i> Rehd. et Wils. var. <i>biloba</i> Rehd. et Wils.的干燥干皮、根皮及枝皮 | 生品 | 30.98g | 上药粉碎成粗粒，每服123.92g，以水1800mL，煮取900mL，多次频服，以微利为度。 | 【功效】通腑泄热，祛风通络 【主治】中风中脏腑之便秘。症见二便不通，猝然昏仆、半身不遂、四肢不举、口噤不语，舌质暗红，苔黄腻，脉滑数。 |
| | | 大黄 | 蓼科植物掌叶大黄 <i>Rheum palmatum</i> L.、唐古特大黄 <i>Rheum tanguticum</i> Maxim.ex Balf. 或药用大黄 <i>Rheum officinale</i> Baill.的干燥根及根茎 | 生品 | 30.98g | | |
| | | 枳实 | 芸香科植物酸橙 <i>Citrus aurantium</i> L.及其栽培变种的干燥幼果 | 生品 | 30.98g | | |
| | | 羌活 | 伞形科植物羌活 <i>Notopterygium incisum</i> Ting ex H. T. Chang 的干燥根茎和根 | 生品 | 30.98g | | |
| 备注 | 据原方中用法“终日服之”，则本方的日服总量为 123.92g，各药的日服量折算如下：厚朴 30.98g，大黄 30.98g，枳实 30.98g，羌活 30.98g。 | | | | | | |

(二十三) 桑白皮汤

| 基本信息 | | 现代对应情况 | | | | | |
|-------------------|--|--------|---|------|-------|---------------------------------|---|
| 出处 | 处方、制法及用法 | 药味名称 | 基原及用药部位 | 炮制规格 | 折算剂量 | 用法用量 | 功能主治 |
| 《景岳全书》 (明·张景岳) | 桑白皮、半夏、苏子、杏仁、贝母、山栀、黄芩、黄连各八分。水二盅，姜三片，煎八分，温服。 | 桑白皮 | 桑科植物桑 <i>Morus alba</i> L.的干燥根皮 | 生品 | 2.98g | 用水 400mL，加生姜 3.00g，煎至 160mL 温服。 | 【功效】清热化痰，降气平喘。 【主治】痰热郁肺之喘证。症见喘咳气涌，胸部胀痛，痰多质黏色黄或夹血痰；伴胸中烦闷，身热有汗，口渴而喜冷饮；面赤咽干，尿赤便秘；舌质红，苔黄腻，脉滑数。 |
| | | 半夏 | 天南星科植物半夏 <i>Pinellia ternata</i> (Thunb.) Breit.的干燥块茎 | 清半夏 | 2.98g | | |
| | | 紫苏子 | 唇形科植物紫苏 <i>Perilla frutescens</i> (L.) Britt.的干燥成熟果实 | 生品 | 2.98g | | |
| | | 苦杏仁 | 蔷薇科植物杏 <i>Prunus armeniaca</i> L.的干燥成熟种子 | 燀苦杏仁 | 2.98g | | |
| | | 浙贝母 | 百合科植物浙贝母 <i>Fritillaria thunbergii</i> Miq.的干燥鳞茎 | 生品 | 2.98g | | |
| | | 栀子 | 茜草科植物栀子 <i>Gardenia jasminoides</i> Ellis 的干燥成熟果实 | 生品 | 2.98g | | |
| | | 黄芩 | 唇形科植物黄芩 <i>Scutellaria baicalensis</i> Georgi 的干燥根 | 生品 | 2.98g | | |
| | | 黄连 | 毛茛科植物黄连 <i>Coptis chinensis</i> Franch、三角叶黄连 <i>Coptis deltoidea</i> C. Y. Cheng et Hsiao、云连 <i>Coptis teeta</i> Wall.的干燥根茎 | 生品 | 2.98g | | |
| | | 生姜 | 姜科植物姜 <i>Zingiber officinale</i> Rosc.的新鲜根茎 | 生品 | 3.00g | | |
| 备注 | 1.本方未明确是日服量还是单次服量，建议将原方剂量作为每次服用量，日服 3 次。 2.燀苦杏仁：即燀苦杏仁 | | | | | | |

(二十四) 暖肝煎

| 基本信息 | | 现代对应情况 | | | | | |
|-------------------|--|--------|---|------|--------|-------------------------|---|
| 出处 | 处方、制法及用法 | 药味名称 | 基原及用药部位 | 炮制规格 | 折算剂量 | 用法用量 | 功能主治 |
| 《景岳全书》 (明·张景岳) | 当归二、三钱，枸杞三钱，茯苓二钱，小茴香二钱，肉桂一、二钱，乌药二钱，沉香一钱，或木香亦可。水一盅半，加生姜三、五片，煎七分，食远温服。 | 当归 | 伞形科植物当归 <i>Angelica sinensis</i> (Oliv.) Diels 的干燥根 | 生品 | 9.33g | 以水 300mL，煮取 140mL，食远温服。 | 【功效】暖肝温肾，行气止痛。 【主治】肝肾不足，寒凝肝脉证。症见睾丸冷缩，或小腹疼痛，疝气疼痛，畏寒喜暖，舌淡苔白，脉沉迟。 |
| | | 枸杞子 | 茄科植物宁夏枸杞 <i>Lycium barbarum</i> L.的干燥成熟果实 | 生品 | 11.19g | | |
| | | 茯苓 | 多孔菌科真菌茯苓 <i>Poria cocos</i> (Schw.) Wolf 的干燥菌核 | 生品 | 7.46g | | |
| | | 小茴香 | 伞形科植物茴香 <i>Foeniculum vulgare</i> Mill.的干燥成熟果实 | 生品 | 7.46g | | |
| | | 肉桂 | 樟科植物肉桂 <i>Cinnamomum cassia</i> Presl 的干燥树皮 | 生品 | 5.60g | | |
| | | 乌药 | 樟科植物乌药 <i>Lindera aggregata</i> (Sims) Kosterm.的干燥块根 | 生品 | 7.46g | | |
| | | 沉香 | 瑞香科植物白木香 <i>Aquilaria sinensis</i> (Lour.) Gilg 含有树脂的木材 | 生品 | 3.73g | | |
| | | 生姜 | 姜科植物姜 <i>Zingiber officinale</i> Rosc. 的新鲜根茎 | 生品 | 4.00g | | |
| 备注 | 本方未明确是日服量还是单次服量，建议结合临床实际，日 1~3 剂遵医嘱使用。 | | | | | | |

(二十五) 托里消毒散

| 基本信息 | | 现代对应情况 | | | | | |
|-------------------|--|--------|--|------|-------|------------------------|--|
| 出处 | 处方、制法及用法 | 药味名称 | 基原及用药部位 | 炮制规格 | 折算剂量 | 用法用量 | 功能主治 |
| 《外科正宗》 (明·陈实功) | 人参、川芎、白芍、黄芪、当归、白术、茯苓、金银花各一钱，白芷、甘草、皂角针、桔梗各五分。水二盅，煎八分，食远服。 | 人参 | 五加科植物人参 <i>Panax ginseng</i> C. A. Mey. 的干燥根和根茎 | 生品 | 3.73g | 以水 400mL，煮取 160mL，食远服。 | 【功效】益气养血，托毒生肌。 【主治】气血两虚之痈疽。症见脓水稀薄，疮面新肉不生，色淡红而不鲜或暗红，愈合缓慢，或伴面色无华，神疲乏力，纳少，舌质淡胖，苔少，脉沉细无力。 |
| | | 川芎 | 伞形科植物川芎 <i>Ligusticum chuanxiong</i> Hort. 的干燥根茎 | 生品 | 3.73g | | |
| | | 白芍 | 毛茛科植物芍药 <i>Paeonia lactiflora</i> Pall. 的干燥根 | 生品 | 3.73g | | |
| | | 黄芪 | 豆科植物蒙古黄芪 <i>Astragalus membranaceus</i> (Fisch.) Bge. var. <i>mongholicus</i> (Bge.) Hsiao 或膜荚黄芪 <i>Astragalus membranaceus</i> (Fisch.) Bge. 的干燥根 | 生品 | 3.73g | | |
| | | 当归 | 伞形科植物当归 <i>Angelica sinensis</i> (Oliv.) Diels 的干燥根 | 生品 | 3.73g | | |
| | | 白术 | 菊科植物白术 <i>Atractylodes macrocephala</i> Koidz. 的干燥根茎 | 生品 | 3.73g | | |
| | | 茯苓 | 多孔菌科真菌茯苓 <i>Poria cocos</i> (Schw.) Wolf 的干燥菌核 | 生品 | 3.73g | | |
| | | 金银花 | 忍冬科植物忍冬 <i>Lonicera japonica</i> Thunb. 的干燥花蕾或带初开的花 | 生品 | 3.73g | | |
| | | 白芷 | 伞形科植物白芷 <i>Angelica dahurica</i> (Fisch. ex Hoffm.) Benth. et Hook. f. 或杭白芷 <i>Angelica dahurica</i> (Fisch. ex Hoffm.) Benth. | 生品 | 1.86g | | |

| | | | | | | | |
|----|--|-----|--|----|-------|--|--|
| | | | et Hook. f. var. <i>formosana</i> (Boiss.) Shan et Yuan 的干燥根 | | | | |
| | | 甘草 | 豆科植物甘草 <i>Glycyrrhiza uralensis</i> Fisch. 的干燥根和根茎 | 生品 | 1.86g | | |
| | | 皂角刺 | 豆科植物皂荚 <i>Gleditsia sinensis</i> Lam. 的干燥棘刺 | 生品 | 1.86g | | |
| | | 桔梗 | 桔梗科植物桔梗 <i>Platycodon grandiflorum</i> (Jacq.) A. DC. 的干燥根 | 生品 | 1.86g | | |
| 备注 | 本方未明确是日服量还是单次服量，建议将原方剂量作为每次服用量，日服 3 次。 | | | | | | |

(二十六) 清上蠲痛汤

| 基本信息 | | 现代对应情况 | | | | | |
|-------------------|---|--------|--|------|-------|--------------------------|---|
| 出处 | 处方、制法及用法 | 药味名称 | 基原及用药部位 | 炮制规格 | 折算剂量 | 用法用量 | 功能主治 |
| 《寿世保元》 (明·龚廷贤) | 当归一钱(酒洗), 小川芎一钱, 白芷一钱, 细辛三分, 羌活一钱, 独活一钱, 防风一钱, 菊花五分, 蔓荆子五分, 苍术一钱(米泔浸), 片苓一钱五分(酒炒), 麦门冬一钱, 甘草三分(生)。上锉一剂, 生姜煎服。 | 当归 | 伞形科植物当归 <i>Angelica sinensis</i> (Oliv.) Diels 的干燥根 | 酒当归 | 3.73g | 加 生 姜 3.00g, 水煎 服。 | 【功效】疏风散邪, 清热止痛。 【主治】风邪上扰之头痛。症见头痛、发热、恶风, 舌苔薄黄, 脉浮数。 |
| | | 川芎 | 伞形科植物川芎 <i>Ligusticum chuanxiong</i> Hort. 的干燥根茎 | 生品 | 3.73g | | |
| | | 白芷 | 伞形科植物白芷 <i>Angelica dahurica</i> (Fisch. ex Hoffm.) Benth. et Hook. f. 或杭白芷 <i>Angelica dahurica</i> (Fisch. ex Hoffm.) Benth. et Hook. f. var. <i>formosana</i> (Boiss.) Shan et Yuan 的干燥根 | 生品 | 3.73g | | |
| | | 细辛 | 马兜铃科植物北细辛 <i>Asarum heterotropoides</i> Fr. Schmidt var. <i>mandshuricum</i> (Maxim.) Kitag.、汉城细辛 <i>Asarum sieboldii</i> Miq. var. <i>seoulense</i> Nakai 或华细辛 <i>Asarum sieboldii</i> Miq. 的干燥根和根茎 | 生品 | 1.12g | | |
| | | 羌活 | 伞形科植物羌活 <i>Notopterygium incisum</i> Ting ex H. T. Chang 的干燥根茎和根 | 生品 | 3.73g | | |
| | | 独活 | 伞形科植物重齿毛当归 <i>Angelica pubescens</i> Maxim. f. <i>biserrata</i> Shan et Yuan 的干燥根 | 生品 | 3.73g | | |
| | | 防风 | 伞形科植物防风 <i>Saposhnikovia divaricata</i> (Turcz.) Schischk. 的干燥根 | 生品 | 3.73g | | |
| | | 菊花 | 菊科植物菊 <i>Chrysanthemum morifolium</i> Ramat. 的干燥头状花序 | 生品 | 1.87g | | |
| | | 蔓荆子 | 马鞭草科植物单叶蔓荆 <i>Vitex trifolia</i> L. var. | 生品 | 1.87g | | |

| | | | | | | | |
|----|--|----|--|--------|-------|--|--|
| | | | <i>simplicifolia</i> Cham.或蔓荆 <i>Vitex trifolia</i> L. 的干燥成熟果实 | | | | |
| | | 苍术 | 菊科植物茅苍术 <i>Atractylodes lancea</i> (Thunb.) DC. 或北苍术 <i>Atractylodes chinensis</i> (DC.) Koidz.的干燥根茎 | 米泔水制苍术 | 3.73g | | |
| | | 黄芩 | 唇形科植物黄芩 <i>Scutellaria baicalensis</i> Georgi 的干燥根 | 酒黄芩 | 5.60g | | |
| | | 麦冬 | 百合科植物麦冬 <i>Ophiopogon japonicus</i> (L.f) Ker-Gawl. 的干燥块根 | 生品 | 3.73g | | |
| | | 甘草 | 豆科植物甘草 <i>Glycyrrhiza uralensis</i> Fisch. 的干燥根和根茎 | 生品 | 1.12g | | |
| | | 生姜 | 姜科植物姜 <i>Zingiber officinale</i> Rosc.的新鲜根茎 | 生品 | 3.00g | | |
| 备注 | <p>1.原文未注明生姜用量，结合原方剂量，建议生姜用量为 3.00g。</p> <p>2.本方未明确是日服量还是单次服量，建议将原方剂量作为每次服用量，日服 3 次。</p> <p>3.米泔水制苍术：参考 2020 年版《吉林省中药饮片炮制规范》中“米泔水制苍术”炮制方法进行炮制。</p> | | | | | | |

(二十七) 养胃汤

| 基本信息 | | 现代对应情况 | | | | | |
|-------------------|--|--------|---|--------|--------|--|--|
| 出处 | 处方、制法及用法 | 药味名称 | 基原及用药部位 | 炮制规格 | 折算剂量 | 用法用量 | 功能主治 |
| 《证治准绳》 (明·王肯堂) | 半夏(汤洗七次)、厚朴(去粗皮、姜汁炒)、苍术(米泔浸一宿,洗切,炒)各一两,橘红七钱半,藿香叶(洗去土)、草果(去皮膜)、茯苓(去黑皮)、人参(去芦)各半两,炙甘草二钱半。右咬咀,每服四钱,水一盏半,姜七片,乌梅一个,煎六分,热服。 | 半夏 | 天南星科植物半夏 <i>Pinellia ternata</i> (Thunb.) Breit. 的干燥块茎 | 清半夏 | 37.30g | 上药粉碎为粗粒,每服 14.92g,加水 450 mL,与生姜、乌梅共煎至 180 mL。热服。 | 【功效】温中解表,调气养胃。 【主治】外感风寒,内伤生冷证。症见憎寒壮热,头目昏疼,肢体拘急,或胸满呕恶、不思饮食,舌淡苔白或腻,脉弦迟。 |
| | | 厚朴 | 木兰科植物厚朴 <i>Magnolia officinalis</i> Rehd. et Wils. 或凹叶厚朴 <i>Magnolia officinalis</i> Rehd. et Wils. var. <i>biloba</i> Rehd. et Wils. 的干燥干皮、根皮及枝皮 | 姜厚朴 | 37.30g | | |
| | | 苍术 | 菊科植物茅苍术 <i>Atractylodes lancea</i> (Thunb.) DC. 或北苍术 <i>Atractylodes chinensis</i> (DC.) Koidz. 的干燥根茎 | 米泔水制苍术 | 37.30g | | |
| | | 橘红 | 芸香科植物橘 <i>Citrus reticulata</i> Blanco 及其栽培变种的干燥外层果皮 | 生品 | 27.98g | | |
| | | 藿香叶 | 唇形科植物广藿香 <i>Pogostemon cablin</i> (Blanco) Benth. 的叶片 | 生品 | 18.65g | | |
| | | 草果 | 姜科植物草果 <i>Amomum tsao-ko</i> Crevost et Lemaire 的干燥成熟果实 | 生品 | 18.65g | | |
| | | 茯苓 | 多孔菌科真菌茯苓 <i>Poria cocos</i> (Schw.) Wolf 的白色干燥菌核 | 生品 | 18.65g | | |
| | | 人参 | 五加科植物人参 <i>Panax ginseng</i> C. A. Mey. 的干燥根和根茎 | 生品 | 18.65g | | |
| | | 甘草 | 豆科植物甘草 <i>Glycyrrhiza uralensis</i> Fisch. 的干燥根和根茎 | 炒甘草 | 9.33g | | |
| | | 生姜 | 姜科植物姜 <i>Zingiber officinale</i> Rosc. 的新鲜根茎 | 生品 | 7.00g | | |
| 乌梅 | 蔷薇科植物梅 <i>Prunus mume</i> (Sieb.) Sieb. et Zucc. 的干燥近成熟果实 | 生品 | 3.00g | | | | |
| 备注 | <p>1.本方直接折算剂量并非每日服量,结合方剂组成及每服量,按日服三次计算,则本方的日服总量约为 44.76g,各药的日服量折算如下:米泔水苍术 7.46g,姜厚朴 7.46g,清半夏 7.46g,橘红 5.60g,藿香 3.73g,草果 3.73g,茯苓 3.73g,人参 3.73g,炒甘草 1.87g,另加生姜 21.00g,乌梅 9.00g。</p> <p>2.炒甘草:建议参考 2020 年版《中华人民共和国药典》中清炒法,将甘草原药材除去杂质,洗净,润透,切厚片,趁湿清炒,炒至微黄,干</p> | | | | | | |

燥。

3.米泔水制苍术：参考 2020 年版《吉林省中药饮片炮制规范》中“米泔水制苍术”炮制方法进行炮制。

(二十八) 石决明散

| 基本信息 | | 现代对应情况 | | | | | |
|-----------------|--|--------|--|------|--------|---|---|
| 出处 | 处方、制法及用法 | 药味名称 | 基原及用药部位 | 炮制规格 | 折算剂量 | 用法用量 | 功能主治 |
| 《普济方》 (明·朱橚) | 石决明、羌活（去芦头）、草决明、菊花各一两，甘草（炙，剉）半两。右为散，每服二钱，以水一盏。煎六分，和滓，食后、临卧温服。 | 石决明 | 杂色鲍 <i>Haliotis diversicolor</i> Reeve 或皱纹盘鲍 <i>Haliotis discus hannai</i> Ino 的贝壳 | 生品 | 37.30g | 上药捣碎为散，每服7.46g，加水300mL，煎至180mL，饭后、睡前温服。 | 【功效】疏散风热，清肝明目。 【主治】肝经风热证。症见视物不清，头目不利，或伴有口苦咽干，急躁易怒，便结溲黄；舌红，苔黄，脉弦。 |
| | | 羌活 | 伞形科植物羌活 <i>Notopterygium incisum</i> Ting ex H. T. Chang 的干燥根茎和根 | 生品 | 37.30g | | |
| | | 决明子 | 豆科植物钝叶决明 <i>Cassia obtusifolia</i> L.或决明（小决明） <i>Cassia tora</i> L.的干燥成熟种子 | 生品 | 37.30g | | |
| | | 菊花 | 菊科植物菊 <i>Chrysanthemum morifolium</i> Ramat.的干燥头状花序 | 生品 | 37.30g | | |
| | | 甘草 | 豆科植物甘草 <i>Glycyrrhiza uralensis</i> Fisch.的干燥根和根茎 | 炒甘草 | 18.65g | | |
| 备注 | <p>1.本方直接折算剂量并非每日服量，结合方剂组成及每服量，按日服三次计算，则本方的日服总量约为 22.38g，各药的日服量折算如下：石决明 4.97g，羌活 4.97g，决明子 4.97g，菊花 4.97g，炒甘草 2.49g。</p> <p>2.炒甘草：建议参考 2020 年版《中华人民共和国药典》中清炒法，将甘草原药材除去杂质，洗净，润透，切厚片，趁湿清炒，炒至微黄，干燥。</p> | | | | | | |

(二十九) 三甲复脉汤

| 基本信息 | | 现代对应情况 | | | | | |
|------------------|--|--------|---|------|--------|-----------------------|---|
| 出处 | 处方、制法及用法 | 药味名称 | 基原及用药部位 | 炮制规格 | 折算剂量 | 用法用量 | 功能主治 |
| 《温病条辨》 (清·吴塘) | 炙甘草六钱,干地黄六钱,生白芍六钱,麦冬五钱(不去心),阿胶三钱,麻仁三钱,生牡蛎五钱,生鳖甲八钱,生龟板一两。水八杯,煮取八分三杯,分三次服。 | 甘草 | 豆科植物甘草 <i>Glycyrrhiza uralensis</i> Fisch.的干燥根和根茎 | 炒甘草 | 22.38g | 加水1600mL,煎至480mL,日三服。 | 【功效】滋阴复脉,潜阳息风。 【主治】肝肾阴虚,阴虚动风证。症见心悸怔忡,甚或心痛,手足蠕动、抽搐;或见昼凉夜热,干咳或不咳,甚则瘵厥,口干舌燥,舌红少苔,脉细数。 |
| | | 地黄 | 玄参科植物地黄 <i>Rehmannia glutinosa</i> Libosch.的干燥块根 | 生品 | 22.38g | | |
| | | 白芍 | 毛茛科植物芍药 <i>Paeonia lactiflora</i> Pall.的干燥根 | 生品 | 22.38g | | |
| | | 麦冬 | 百合科植物麦冬 <i>Ophiopogon japonicus</i> (L.f) Ker-Gawl.的干燥块根 | 生品 | 18.65g | | |
| | | 阿胶 | 马科动物驴 <i>Equus asinus</i> L.的干燥皮或鲜皮经煎煮、浓缩制成的固体胶 | 生品 | 11.19g | | |
| | | 火麻仁 | 桑科植物大麻 <i>Cannabis sativa</i> L.的干燥成熟种子 | 生品 | 11.19g | | |
| | | 牡蛎 | 牡蛎科动物长牡蛎 <i>Ostrea gigas</i> Thumberg、牡蛎科动物大连湾牡蛎 <i>Ostrea talienwhanensis</i> Crosse 或近江牡蛎 <i>Ostrea rivularis</i> Gould 的贝壳 | 生品 | 18.65g | | |
| | | 鳖甲 | 鳖科动物鳖 <i>Trionyx sinensis</i> Wiegmann 的背甲 | 生品 | 29.84g | | |
| | | 龟板 | 龟科动物乌龟 <i>Chinemys reevesii</i> (Gray)的腹甲 | 生品 | 37.30g | | |
| 备注 | 炒甘草: 建议参考 2020 年版《中华人民共和国药典》中清炒法, 将甘草原药材除去杂质, 洗净, 润透, 切厚片, 趁湿清炒, 炒至微黄, 干燥。 | | | | | | |

(三十) 新加香薷饮

| 基本信息 | | 现代对应情况 | | | | | |
|------------------|---|--------|---|------|--------|--|---|
| 出处 | 处方、制法及用法 | 药味名称 | 基原及用药部位 | 炮制规格 | 折算剂量 | 用法用量 | 功能主治 |
| 《温病条辨》 (清·吴瑭) | 香薷二钱，银花三钱，鲜扁豆花三钱，厚朴二钱，连翘二钱。水五杯，煮取二杯，先服一杯，得汗止后服，不汗再服，服尽不汗，再作服。 | 香薷 | 唇形科植物石香薷 <i>Mosla chinensis</i> Maxim. 或江香薷 <i>Mosla chinensis</i> ‘Jiangxiangru’的干燥地上部分 | 生品 | 7.46g | 加水 1000mL，煎煮至 400mL，先服用 200mL，汗出后停药，未汗出再服，以汗出为度。 | 【功效】祛暑解表，清热化湿。 【主治】暑温夹湿，复感于寒证。症见发热头痛，恶寒无汗，口渴面赤，胸闷不舒，舌苔白腻，脉浮而数。 |
| | | 金银花 | 忍冬科植物忍冬 <i>Lonicera japonica</i> Thunb.的干燥花蕾或带初开的花 | 生品 | 11.19g | | |
| | | 扁豆花 | 豆科植物扁豆 <i>Dolichos lablab</i> L.的新鲜花 | 鲜品 | 11.19g | | |
| | | 厚朴 | 木兰科植物厚朴 <i>Magnolia officinalis</i> Rehd. et Wils.或凹叶厚朴 <i>Magnolia officinalis</i> Rehd. et Wils. var. <i>biloba</i> Rehd. et Wils.的干燥干皮、根皮及枝皮 | 生品 | 7.46g | | |
| | | 连翘 | 木犀科植物连翘 <i>Forsythia suspensa</i> (Thunb.) Vahl 的干燥果实 | 生品 | 7.46g | | |
| 备注 | | | | | | | |

(三十一) 桑杏汤

| 基本信息 | | 现代对应情况 | | | | | |
|------------------|---|--------|--|------|-------|-------------------------------|--|
| 出处 | 处方、制法及用法 | 药味名称 | 基原及用药部位 | 炮制规格 | 折算剂量 | 用法用量 | 功能主治 |
| 《温病条辨》 (清·吴瑭) | 桑叶一钱，杏仁一钱五分，沙参二钱，象贝一钱，香豉一钱，梔皮一钱，梨皮一钱。水二杯，煮取一杯，顿服之，重者再作服。 | 桑叶 | 桑科植物桑 <i>Morus alba</i> L.的干燥叶 | 生品 | 3.73g | 以水 400mL， 煮取 200mL， 顿服。 | 【功效】清宣温燥， 润肺止咳。 【主治】外感温燥 证。症见头痛，身 热不甚，微恶风寒， 口渴，咽干鼻燥， 干咳无痰或痰少而 黏，舌红，苔薄白 而干，脉浮数而右 脉大。 |
| | | 苦杏仁 | 蔷薇科植物杏 <i>Prunus armeniaca</i> L.的干燥成熟种子 | 焯苦杏仁 | 5.60g | | |
| | | 南沙参 | 桔梗科植物轮叶沙参 <i>Adenophora tetraphylla</i> (Thunb.) Fisch. 或沙参 <i>Adenophora stricta</i> Miq.的干燥根 | 生品 | 7.46g | | |
| | | 浙贝母 | 百合科植物浙贝母 <i>Fritillaria thunbergii</i> Miq.的干燥鳞茎 | 生品 | 3.73g | | |
| | | 淡豆豉 | 豆科植物大豆 <i>Glycine max</i> (L.) Merr.的成熟种子的发酵加工品 | 生品 | 3.73g | | |
| | | 梔子 | 茜草科植物梔子 <i>Gardenia jasminoides</i> Ellis 的干燥成熟果皮 | 生品 | 3.73g | | |
| | | 梨皮 | 蔷薇科植物白梨 <i>Pyrus bretschneideri</i> Rehd.、沙梨 <i>Pyrus pyrifolia</i> (Burm. f.) Nakai 或秋子梨 <i>Pyrus ussuriensis</i> Maxim.的干燥果皮 | 生品 | 3.73g | | |
| 备注 | 1.梨皮基原系参考 2018 年版《湖北省中药材质量标准》中相关规定。 2.本方是单次剂量，日服 1-2 次。 3.焯苦杏仁：即焯杏仁 | | | | | | |

(三十二) 益胃汤

| 基本信息 | | 现代对应情况 | | | | | |
|--------------|---|--------|---|------|--------|--|--|
| 出处 | 处方、制法及用法 | 药味名称 | 基原及用药部位 | 炮制规格 | 折算剂量 | 用法用量 | 功能主治 |
| 《温病条辨》（清·吴塘） | 沙参三钱，麦冬五钱，冰糖一钱，细生地五钱，玉竹一钱五分（炒香）。水五杯，煮取二杯，分二次服，渣再煮一杯服。 | 南沙参 | 桔梗科植物轮叶沙参 <i>Adenophora tetraphylla</i> (Thunb.) Fisch. 或沙参 <i>Adenophora stricta</i> Miq. 的干燥根 | 生品 | 11.19g | 以水 1000mL，煮取 400mL；余渣另加水 500mL，煮取 200mL。 | 【功效】养阴益胃。 【主治】胃阴虚证。症见胃脘灼热隐痛，饥不欲食，口干咽燥，大便秘结，或干呕、呃逆，舌红少津，脉细数。 |
| | | 麦冬 | 百合科植物麦冬 <i>Ophiopogon japonicus</i> (L.f) Ker-Gawl. 的干燥块根 | 生品 | 18.65g | | |
| | | 冰糖 | 砂糖经再溶、洗净处理和重结晶而制得大颗粒结晶糖 | 生品 | 3.73g | | |
| | | 地黄 | 玄参科植物地黄 <i>Rehmannia glutinosa</i> Libosch. 的干燥块根 | 生品 | 18.65g | | |
| | | 玉竹 | 百合科植物玉竹 <i>Polygonatum odoratum</i> (Mill.) Druce 的干燥根茎 | 炒玉竹 | 5.60g | | |
| 备注 | 1.建议将两次煎取所得药液混合，分 3 次服用。 2.炒玉竹：参考 2020 年版《中华人民共和国药典》清炒法进行炮制。 | | | | | | |

(三十三) 蠲痹汤

| 基本信息 | | 现代对应情况 | | | | | |
|-------------------|---|--------|---|------|--------|------|--|
| 出处 | 处方、制法及用法 | 药味名称 | 基原及用药部位 | 炮制规格 | 折算剂量 | 用法用量 | 功能主治 |
| 《医学心悟》 (清·程国彭) | 羌活、独活各一钱，桂心五分，秦艽一钱，当归三钱，川芎七分，甘草五分(炙)，海风藤二钱，桑枝三钱，乳香、木香各八分。水煎服。 | 羌活 | 伞形科植物羌活 <i>Notopterygium incisum</i> Ting ex H. T. Chang 的干燥根茎和根 | 生品 | 3.73g | 水煎服。 | 【功效】祛风除湿，散寒止痛。 【主治】风寒湿痹证。症见肢体关节、肌肉疼痛，或游走不定，或遇寒加重，得热痛缓，或肢体关节酸楚、重着，或肌肤麻木不仁，关节屈伸不利，舌淡苔薄白或腻，脉弦紧或濡缓。 |
| | | 独活 | 伞形科植物重齿毛当归 <i>Angelica pubescens</i> Maxim. f. <i>biserrata</i> Shan et Yuan 的干燥根 | 生品 | 3.73g | | |
| | | 肉桂 | 樟科植物肉桂 <i>Cinnamomum cassia</i> Presl 的干燥树皮 | 生品 | 1.87g | | |
| | | 秦艽 | 龙胆科植物秦艽 <i>Gentiana macrophylla</i> Pall. 的干燥根 | 生品 | 3.73g | | |
| | | 当归 | 伞形科植物当归 <i>Angelica sinensis</i> (Oliv.) Diels 的干燥根 | 生品 | 11.19g | | |
| | | 川芎 | 伞形科植物川芎 <i>Ligusticum chuanxiong</i> Hort. 的干燥根茎 | 生品 | 2.61g | | |
| | | 甘草 | 豆科植物甘草 <i>Glycyrrhiza uralensis</i> Fisch. 的干燥根和根茎 | 炒甘草 | 1.87g | | |
| | | 海风藤 | 胡椒科植物风藤 <i>Piper kadsura</i> (Choisy) Ohwi 的干燥藤茎 | 生品 | 7.46g | | |
| | | 桑枝 | 桑科植物桑 <i>Morus alba</i> L. 的干燥嫩枝 | 生品 | 11.19g | | |
| | | 乳香 | 橄榄科植物乳香树 <i>Boswellia carterii</i> Birdw. 树皮渗出的树脂 | 生品 | 2.98g | | |
| 木香 | 菊科植物木香 <i>Aucklandia lappa</i> Decne. 的干燥根 | 生品 | 2.98g | | | | |
| 备注 | 1.本方未明确是日服量还是单次服量，建议将原方剂量作为每日服用量，分3次服。 | | | | | | |

| | |
|--|--|
| | 2.炒甘草：建议参考 2020 年版《中华人民共和国药典》中清炒法，将甘草原药材除去杂质，洗净，润透，切厚片，趁湿清炒，炒至微黄，干燥。 |
|--|--|

(三十四) 藿朴夏苓汤

| 基本信息 | | 现代对应情况 | | | | | |
|-------------|---|--------|---|------|--------|----------------|---|
| 出处 | 处方、制法及用法 | 药味名称 | 基原及用药部位 | 炮制规格 | 折算剂量 | 用法用量 | 功能主治 |
| 《医原》(清·石寿棠) | 杜藿香二钱，真川朴一钱，姜半夏钱半，赤苓三钱，光杏仁三钱，生薏仁四钱，白蔻末六分，猪苓钱半，淡香豉三钱，建泽泻钱半。选用丝通草三钱，或五钱煎汤代水，煎上药服。 | 土藿香 | 唇形科植物藿香 <i>Agastache rugosa</i> (Fisch. et Mey.) O.Ktze 的干燥地上部分 | 生品 | 7.46g | 以通草煎汤代水，入余药煎服。 | 【功效】宣通气机，解表化湿。 【主治】湿温初起，湿重热轻证。症见身热恶寒，肢体倦怠，胸闷口腻，面垢，或嗜睡，舌苔白或腻，脉濡缓。 |
| | | 厚朴 | 木兰科植物厚朴 <i>Magnolia officinalis</i> Rehd. et Wils. 或凹叶厚朴 <i>Magnolia officinalis</i> Rehd. et Wils. var. <i>biloba</i> Rehd. et Wils. 的干燥干皮、根皮及枝皮 | 生品 | 3.73g | | |
| | | 半夏 | 天南星科植物半夏 <i>Pinellia ternata</i> (Thunb.) Breit. 的干燥块茎 | 姜半夏 | 5.60g | | |
| | | 赤茯苓 | 多孔菌科真菌茯苓 <i>Poria cocos</i> (Schw.) Wolf 呈淡棕色、淡红色的干燥菌核 | 生品 | 11.19g | | |
| | | 苦杏仁 | 蔷薇科植物杏 <i>Prunus armeniaca</i> L. 的干燥成熟种子 | 燀苦杏仁 | 11.19g | | |
| | | 薏苡仁 | 禾本科植物薏米 <i>Coix lacryma-jobi</i> L. var. <i>ma-yuen</i> (Roman.) Stapf 的干燥成熟种仁 | 生品 | 14.92g | | |
| | | 豆蔻 | 姜科植物白豆蔻 <i>Amomum kravanh</i> Pierre ex Gagnep. 或爪哇白豆蔻 <i>Amomum compactum</i> Soland ex Maton 的干燥成熟果实 | 生品 | 2.24g | | |
| | | 猪苓 | 多孔菌属真菌猪苓 <i>Polyporus umbellatus</i> (Pers.) Fries 的干燥菌核 | 生品 | 5.60g | | |
| | | 淡豆豉 | 豆科植物大豆 <i>Glycine max</i> (L.) Merr. 的干燥成熟种子(黑豆)的发酵加工品 | 生品 | 11.19g | | |
| | | 泽泻 | 泽泻科植物东方泽泻 <i>Alisma orientate</i> (Sam.) Juzep. 的干燥块茎 | 生品 | 5.60g | | |
| | | 通草 | 五加科植物通脱木 <i>Tetrapanax papyrifer</i> (Hook.) K. Koch 的干燥茎髓 | 生品 | 14.92g | | |

| | |
|----|---|
| 备注 | <ol style="list-style-type: none">1.本方未明确是日服量还是单次服量，建议将原方剂量作为每日服用量，分3次服。2.土藿香：参考2015年版《浙江省中药炮制规格》载的土藿香饮片规格。3.煨苦杏仁：即焯苦杏仁 |
|----|---|

(三十五) 丁香柿蒂散

| 基本信息 | | 现代对应情况 | | | | | |
|-----------------|--------------------------------------|--------|---|------|--------|-------|---|
| 出处 | 处方、制法及用法 | 药味名称 | 基原及用药部位 | 炮制规格 | 折算剂量 | 用法用量 | 功能主治 |
| 《伤寒瘟疫条辨》（清·杨栗山） | 丁香、柿蒂各二钱，人参一钱，生姜三钱。水煎温服。 | 丁香 | 桃金娘科植物丁香 <i>Eugenia caryophyllata</i> Thunb.的干燥花蕾 | 生品 | 7.46g | 水煎温服。 | 【功效】温中益气，降逆止呃。 【主治】胃气虚寒之呃逆。症见呃逆不止，胸脘痞闷，舌淡苔白，脉沉迟。 |
| | | 柿蒂 | 柿树科植物柿 <i>Diospyros kaki</i> Thunb.的干燥宿萼 | 生品 | 7.46g | | |
| | | 人参 | 五加科植物人参 <i>Panax ginseng</i> C. A. Mey.的干燥根和根茎 | 生品 | 3.73g | | |
| | | 生姜 | 姜科植物姜 <i>Zingiber officinale</i> Rosc.的新鲜根茎 | 生品 | 11.19g | | |
| 备注 | 本方未明确是日服量还是单次服量，建议将原方剂量作为每日服用量，分3次服。 | | | | | | |

(三十六) 清经散

| 基本信息 | | 现代对应情况 | | | | | |
|---------------|---|--------|--|---------|--------|------|--|
| 出处 | 处方、制法及用法 | 药味名称 | 基原及用药部位 | 炮制规格 | 折算剂量 | 用法用量 | 功能主治 |
| 《傅青主女科》（清·傅山） | 丹皮三钱，地骨皮五钱，白芍三钱（酒炒），大熟地三钱（九蒸），青蒿二钱，白茯苓一钱，黄柏五分（盐水浸，炒）。水煎服。 | 牡丹皮 | 毛茛科植物牡丹 <i>Paeonia suffruticosa</i> Andr.的干燥根皮 | 生品 | 11.19g | 水煎服。 | 【功效】清热养阴，凉血调经。 【主治】阴虚火旺之月经先期。症见月经先期量多，色深红或紫，质黏稠，或伴心烦，面红口干，小便短黄，大便燥结，舌红，苔黄，脉弦细数。 |
| | | 地骨皮 | 茄科植物枸杞 <i>Lycium chinense</i> Mill.的干燥根皮 | 生品 | 18.65g | | |
| | | 白芍 | 毛茛科植物芍药 <i>Paeonia lactiflora</i> Pall.的干燥根 | 酒白芍 | 11.19g | | |
| | | 熟地黄 | 玄参科植物地黄 <i>Rehmannia glutinosa</i> Libosch.根茎的炮制加工品 | 熟地黄（蒸法） | 11.19g | | |
| | | 青蒿 | 菊科植物黄花蒿 <i>Artemisia annua</i> L.的干燥地上部分 | 生品 | 7.46g | | |
| | | 茯苓 | 多孔菌科真菌茯苓 <i>Poria cocos</i> (Schw.) Wolf 的白色干燥菌核 | 生品 | 3.73g | | |
| | | 黄柏 | 芸香科植物黄皮树 <i>Phellodendron chinense</i> Schneid.的干燥树皮 | 盐黄柏 | 1.87g | | |
| 备注 | 本方未明确是日服量还是单次服量，建议将原方剂量作为每日服用量，分3次服。 | | | | | | |

(三十七) 清肝止淋汤

| 基本信息 | | 现代对应情况 | | | | | |
|---------------|--|--------|---|-------|--------|------|--|
| 出处 | 处方、制法及用法 | 药味名称 | 基原及用药部位 | 炮制规格 | 折算剂量 | 用法用量 | 功能主治 |
| 《傅青主女科》(清·傅山) | 白芍一两(醋炒), 当归一两(酒洗), 生地五钱(酒炒), 阿胶三钱(白面炒), 粉丹皮三钱, 黄柏二钱, 牛膝二钱, 香附一钱(酒炒), 红枣十个, 小黑豆一两。水煎服。 | 白芍 | 毛茛科植物芍药 <i>Paeonia lactiflora</i> Pall. 的干燥根 | 醋白芍 | 37.30g | 水煎服。 | 【功效】养血柔肝, 清热化湿。 【主治】肝旺脾虚, 湿热下注证。症见带下色红, 淋漓不断, 或见经间期出血, 色深红质稠, 舌红苔黄腻, 脉滑数。 |
| | | 当归 | 伞形科植物当归 <i>Angelica sinensis</i> (Oliv.) Diels 的干燥根 | 酒当归 | 37.30g | | |
| | | 地黄 | 玄参科植物地黄 <i>Rehmannia glutinosa</i> Libosch. 的干燥块根 | 酒生地 | 18.65g | | |
| | | 阿胶 | 马科动物驴 <i>Equus asinus</i> L. 的皮经煎煮、浓缩制成的固体胶 | 白面炒阿胶 | 11.19g | | |
| | | 牡丹皮 | 毛茛科植物牡丹 <i>Paeonia suffruticosa</i> Andr. 的干燥根皮 | 生品 | 11.19g | | |
| | | 黄柏 | 芸香科植物黄皮树 <i>Phellodendron chinense</i> Schneid. 的干燥树皮 | 生品 | 7.46g | | |
| | | 牛膝 | 苋科植物牛膝 <i>Achyranthes bidentata</i> Bl. 的干燥根 | 生品 | 7.46g | | |
| | | 香附 | 莎草科植物莎草 <i>Cyperus rotundus</i> L. 的干燥根茎 | 酒香附 | 3.73g | | |
| | | 大枣 | 鼠李科植物枣 <i>Ziziphus jujuba</i> Mill. 的干燥成熟果实 | 生品 | 30.00g | | |
| | | 小黑豆 | 豆科植物野大豆 <i>Glycine soja</i> Sieb. et Zucc 的干燥成熟种子 | 生品 | 37.30g | | |
| 备注 | <p>1. 鉴于古代“酒洗”、“酒炒”炮制方法演变到现代, 与“酒炙”法内涵基本一致, 建议采用酒炙法。酒生地、酒香附: 建议参考 2020 年版《中华人民共和国药典》酒炙法进行炮制。</p> <p>2. 醋白芍: 建议参考 2020 年版《中华人民共和国药典》醋炙法进行炮制。</p> <p>3. 白面炒阿胶: 建议参考 2020 年版《中华人民共和国药典》炒法, 以白面粉为辅料进行炮制。</p> <p>4. 小黑豆: 建议参考 1986 年版《浙江省中药炮制规范》收录的“野大豆”规格。</p> | | | | | | |

| | |
|--|---|
| | 5.本方原文未明确是日服量还是单次服量，建议将原方剂量作为每日服用量，分3次服用。 |
|--|---|

(三十八) 两地汤

| 基本信息 | | 现代对应情况 | | | | | |
|-------------------|--|--------|--|------|--------|------|--|
| 出处 | 处方、制法及用法 | 药味名称 | 基原及用药部位 | 炮制规格 | 折算剂量 | 用法用量 | 功能主治 |
| 《傅青主女科》 (清·傅山) | 大生地一两(酒炒), 元参一两,白芍药五钱 (酒炒),麦冬肉五钱, 地骨皮三钱,阿胶三 钱。水煎服。 | 地黄 | 玄参科植物地黄 <i>Rehmannia glutinosa</i> Libosch.的干燥块根 | 酒生地 | 37.30g | 水煎服。 | 【功效】养阴清 热,凉血调经。 【主治】阴虚血热 之月经先期。症见 经来先期,量少或 量多,色红质稠, 或见两颧潮红,手 足心热,咽干口 燥,舌红少苔,脉 细数。 |
| | | 玄参 | 玄参科植物玄参 <i>Scrophularia</i> <i>ningpoensis</i> Hemsl.的干燥根 | 生品 | 37.30g | | |
| | | 白芍 | 毛茛科植物芍药 <i>Paeonia lactiflora</i> Pall.的干燥根 | 酒白芍 | 18.65g | | |
| | | 麦冬 | 百合科植物麦冬 <i>Ophiopogon japonicus</i> (L.f) Ker-Gawl.的干燥块根 | 生品 | 18.65g | | |
| | | 地骨皮 | 茄科植物枸杞 <i>Lycium chinense</i> Mill.的 干燥根皮 | 生品 | 11.19g | | |
| | | 阿胶 | 马科动物驴 <i>Equus asinus</i> L.的干燥皮 或鲜皮经煎煮、浓缩制成的固体胶 | 生品 | 11.19g | | |
| 备注 | 1.酒生地:建议参考2020年版《中华人民共和国药典》酒炙法进行炮制。 2.本方原文未明确是日服量还是单次服量,建议将原方剂量作为每日服用量,分3次服用。 | | | | | | |

(三十九) 四妙勇安汤

| 基本信息 | | 现代对应情况 | | | | | |
|-------------------|---|--------|---|------|---------|------|---|
| 出处 | 处方、制法及用法 | 药味名称 | 基原及用药部位 | 炮制规格 | 折算剂量 | 用法用量 | 功能主治 |
| 《验方新编》 (清·鲍相璈) | 金银花、元参各三两， 当归二两，甘草一两。 水煎服。 | 金银花 | 忍冬科植物忍冬 <i>Lonicera japonica</i> Thunb.的干燥花蕾或带初开的花 | 生品 | 111.90g | 水煎服。 | 【功效】清热解毒，活血止痛。 【主治】热毒炽盛之脱疽。症见患肢暗红微肿，灼热疼痛，久则溃烂，甚则脚趾节节脱落、延及足背，发热口渴，舌红脉数。 |
| | | 玄参 | 玄参科植物玄参 <i>Scrophularia ningpoensis</i> Hemsl.的干燥根 | 生品 | 111.90g | | |
| | | 当归 | 伞形科植物当归 <i>Angelica sinensis</i> (Oliv.) Diels 的干燥根 | 生品 | 74.60g | | |
| | | 甘草 | 豆科植物甘草 <i>Glycyrrhiza uralensis</i> Fisch.的干燥根和根茎 | 生品 | 37.30g | | |
| 备注 | 本方原文未明确是日服量还是单次服量，建议将原方剂量作为每日服用量，分3次服用。 | | | | | | |

(四十) 除湿胃苓汤

| 基本信息 | | 现代对应情况 | | | | | |
|------------------|--|--------|---|------|-------|--|---|
| 出处 | 处方、制法及用法 | 药味名称 | 基原及用药部位 | 炮制规格 | 折算剂量 | 用法用量 | 功能主治 |
| 《医宗金鉴》 (清·吴谦) | 苍术(炒)、厚朴(姜炒)、陈皮、猪苓、泽泻、赤茯苓、白术(土炒)、滑石、防风、山栀子(生,研)、木通各一钱,肉桂、甘草(生)各三分。水二盅,灯心五十寸,煎八分,食前服。 | 苍术 | 菊科植物茅苍术 <i>Atractylodes lancea</i> (Thunb.)DC. 或北苍术 <i>Atractylodes chinensis</i> (DC.)Koidz.的干燥根茎 | 麸炒苍术 | 3.73g | 以水 400mL, 加灯心草 0.15g, 煎至 160 mL, 饭前服用。 | 【功效】健脾利湿, 清热止痒。 【主治】脾肺湿热之蛇串疮。症见簇集性水疱, 色黄白, 大小不等, 糜烂疼痛流水, 舌红苔黄腻, 脉滑数。 |
| | | 厚朴 | 木兰科植物厚朴 <i>Magnolia officinalis</i> Rehd. et Wils. 或凹叶厚朴 <i>Magnolia officinalis</i> Rehd. et Wils. var. <i>biloba</i> Rehd. et Wils. 的干燥干皮、根皮及枝皮 | 姜厚朴 | 3.73g | | |
| | | 陈皮 | 芸香科植物橘 <i>Citrus reticulata</i> Blanco 及其栽培变种的干燥成熟果皮 | 生品 | 3.73g | | |
| | | 猪苓 | 多孔菌科真菌猪苓 <i>Polyporus umbellatus</i> (Pers.)Fries 的干燥菌核 | 生品 | 3.73g | | |
| | | 泽泻 | 泽泻科植物东方泽泻 <i>Alisma orientate</i> (Sam.) Juzep. 或泽泻 <i>Alisma plantago-aquatica</i> Linn. 的干燥块茎 | 生品 | 3.73g | | |
| | | 赤茯苓 | 多孔菌科真菌茯苓 <i>Poria cocos</i> (Schw.)Wolf 呈淡棕色、淡红色的干燥菌核 | 生品 | 3.73g | | |
| | | 白术 | 菊科植物白术 <i>Atractylodes macrocephala</i> Koidz. 的干燥根茎 | 土炒白术 | 3.73g | | |
| | | 滑石 | 硅酸盐类矿物滑石族滑石, 主含含水硅酸镁[Mg ₃ (SiO ₁₀ (OH) ₂)] | 生品 | 3.73g | | |
| | | 防风 | 伞形科植物防风 <i>Saposhnikovia</i> | 生品 | 3.73g | | |

| | | | | | | | |
|----|---|-----|---|----|-------|--|--|
| | | | <i>divaricata</i> (Turcz.) Schischk.的干燥根 | | | | |
| | | 梔子 | 茜草科植物梔子 <i>Gardenia jasminoides</i> Ellis 的干燥成熟果实 | 生品 | 3.73g | | |
| | | 木通 | 木通科植物木通 <i>Akebia quinata</i> (Thunb.) Decne.、三叶木通 <i>Akebia trifoliata</i> (Thunb.) Koidz.、白木通 <i>Akebia trifoliata</i> (Thunb.) Koidz. var. <i>australis</i> (Diels) Rehd.的干燥藤茎 | 生品 | 3.73g | | |
| | | 肉桂 | 樟科植物肉桂 <i>Cinnamomum cassia</i> Presl 的干燥树皮 | 生品 | 1.12g | | |
| | | 甘草 | 豆科植物甘草 <i>Glycyrrhiza uralensis</i> Fisch.的干燥根和根茎 | 生品 | 1.12g | | |
| | | 灯心草 | 灯心草科植物灯心草 <i>Juncus effusus</i> L.的干燥茎髓 | 生品 | 0.15g | | |
| 备注 | <p>1.本方未明确是日服量还是单次服量，建议将原方剂量作为每次服用量，日服 3 次。</p> <p>2.土炒白术：建议参考 1988 年版《全国中药饮片炮制规范》土炒白术方法进行炮制。</p> | | | | | | |

(四十一) 黄连膏

| 基本信息 | | 现代对应情况 | | | | | |
|------------------|---|--------|---|------|---------|--|--|
| 出处 | 处方、制法及用法 | 药味名称 | 基原及用药部位 | 炮制规格 | 折算剂量 | 用法用量 | 功能主治 |
| 《医宗金鉴》 (清·吴谦) | 黄连三钱，当归尾五钱，生地一两，黄柏三钱，姜黄三钱。香油十二两，将药燥枯，捞去渣；下黄蜡四两溶化尽，用夏布将油滤净，倾入磁碗内，以柳枝不时搅之，候凝为度。 | 黄连 | 毛茛科植物黄连 <i>Coptis chinensis</i> Franch、三角叶黄连 <i>Coptis deltoidea</i> C. Y. Cheng et Hsiao、云连 <i>Coptis teeta</i> Wall.的干燥根茎 | 生品 | 11.19g | 用香油447.6g烧诸药至枯，捞去渣；黄蜡149.2g溶化尽，将油滤净，倾入瓷碗内，搅至凝结。将膏匀涂于纱布上，外敷于患处。 | 【功效】清热润燥，解毒止痛。 【主治】火毒壅盛证。症见痈疽疔疮，局部红肿热痛，舌红苔黄，脉数。 |
| | | 当归尾 | 伞形科植物当归 <i>Angelica sinensis</i> (Oliv.) Diels 的干燥支根 | 生品 | 18.65g | | |
| | | 地黄 | 玄参科植物地黄 <i>Rehmannia glutinosa</i> Libosch.的干燥块根 | 生品 | 37.30g | | |
| | | 黄柏 | 芸香科植物黄皮树 <i>Phellodendron chinense</i> Schneid.的干燥树皮 | 生品 | 11.19g | | |
| | | 姜黄 | 姜科植物姜黄 <i>Curcuma longa</i> L.的干燥根茎 | 生品 | 11.19g | | |
| | | 麻油 | 脂麻科植物脂麻 <i>Sesamum indicum</i> L.的成熟种子用压榨法得到的脂肪油 | 麻油 | 447.60g | | |
| | | 蜂蜡 | 蜜蜂科昆虫中华蜜蜂 <i>Apis cerana</i> Fadricius 分泌的蜡质精制而成 | 黄蜡 | 149.20g | | |
| 备注 | | | | | | | |

(四十二) 清燥救肺汤

| 基本信息 | | 现代对应情况 | | | | | |
|-------------------|---|--------|---|------|--------|-----------------------|---|
| 出处 | 处方、制法及用法 | 药味名称 | 基原及用药部位 | 炮制规格 | 折算剂量 | 用法用量 | 功能主治 |
| 《医门法律》 (清·喻嘉言) | 桑叶三钱（去枝梗），石膏二钱五分（煨），甘草一钱，人参七分，胡麻仁一钱（炒，研），真阿胶八分，麦门冬一钱二分（去心），杏仁七分（炮，去皮尖，炒黄），枇杷叶一片（刷去毛，蜜涂炙黄）。水一碗，煎六分，频频二、三次滚热服。 | 桑叶 | 桑科植物桑 <i>Morus alba</i> L.的干燥叶 | 生品 | 11.19g | 以水 300mL，煎至 180mL，热服。 | 【功效】清燥润肺，益气养阴。 【主治】温燥伤肺，气阴两伤证。身热头痛，干咳无痰，气逆而喘，咽喉干燥，鼻燥，心烦口渴，胸满胁痛，舌干少苔，脉虚大而数。 |
| | | 石膏 | 硫酸盐类矿物石膏族石膏，主含含水硫酸钙（CaSO ₄ ·2H ₂ O） | 煨石膏 | 9.33g | | |
| | | 甘草 | 豆科植物甘草 <i>Glycyrrhiza uralensis</i> Fisch.的干燥根和根茎 | 生品 | 3.73g | | |
| | | 人参 | 五加科植物人参 <i>Panax ginseng</i> C. A. Mey.的干燥根和根茎 | 生品 | 2.61g | | |
| | | 黑芝麻 | 脂麻科植物脂麻 <i>Sesamum indicum</i> L.的干燥成熟种子 | 炒黑芝麻 | 3.73g | | |
| | | 阿胶 | 马科动物驴 <i>Equus asinus</i> L.的干燥皮或鲜皮经煎煮、浓缩制成的固体胶 | 生品 | 2.98g | | |
| | | 麦冬 | 百合科植物麦冬 <i>Ophiopogon japonicus</i> (L.f) Ker-Gawl.的干燥块根 | 生品 | 4.48g | | |
| | | 苦杏仁 | 蔷薇科植物杏 <i>Prunus armeniaca</i> L.的干燥成熟种子 | 炒苦杏仁 | 2.61g | | |
| | | 枇杷叶 | 蔷薇科植物枇杷 <i>Eriobotrya japonica</i> (Thunb.) Lindl.的干燥叶 | 蜜枇杷叶 | 3.73g | | |
| 备注 | <p>1.本方未明确是日服量还是单次服量，建议将原方剂量作为每次服用量，口服 3 次。</p> <p>2.麦冬传统去心，为历代所沿用，延续至今，如 1963 年版《中华人民共和国药典》麦冬炮制项内明确“润透后抽去心”，自 1977 年版《中华人民共和国药典》起不再要求去心。当前麦冬不同产地生产方式有较大区别，不同栽培年限所致性状、气味及内在成分含量均有差异，品质差异较大，栽培年限过短者中柱细小，有鉴于此，建议参考 2015 年版《浙江省中药炮制规范》所规定的浙麦冬饮片规格入药。</p> | | | | | | |

(四十三) 凉血地黄汤

| 基本信息 | | 现代对应情况 | | | | | |
|------------------|---|--------|--|------|--------|-------------------------------------|---|
| 出处 | 处方、制法及用法 | 药味名称 | 基原及用药部位 | 炮制规格 | 折算剂量 | 用法用量 | 功能主治 |
| 《外科大成》 (清·祁坤) | 归尾一钱五分，生地二钱，赤芍一钱，黄连(炒)二钱，枳壳一钱，黄芩一钱(炒黑)，槐角三钱(炒黑)，地榆二钱(炒黑)，荆芥一钱(炒黑)，升麻五分，天花粉八分，甘草五分。右一剂。加生侧柏二钱，用水二大盅，煎一盅，空心服三、四剂，则痛止肿消，更外兼熏洗。 | 当归 | 伞形科当归 <i>Angelica sinensis</i> (Oliv.) Diels 的干燥支根 | 生品 | 5.60g | 水 800mL 或 400mL，煎至 200mL。空腹服用，每日三剂。 | 【功效】清热凉血止血。 【主治】血热肠燥证。症见肛周皮肤肿痛、便血、瘙痒，或见口渴、心烦、眠差，舌红苔黄，脉数。 |
| | | 地黄 | 玄参科植物地黄 <i>Rehmannia glutinosa</i> Libosch. 的干燥块根 | 生品 | 7.46g | | |
| | | 赤芍 | 毛茛科植物芍药 <i>Paeonia lactiflora</i> Pall. 的干燥根 | 生品 | 3.73g | | |
| | | 黄连 | 毛茛科植物黄连 <i>Coptis chinensis</i> Franch、三角叶黄连 <i>Coptis deltoidea</i> C. Y. Cheng et Hsiao、云连 <i>Coptis teeta</i> Wall. 的干燥根茎 | 炒黄连 | 7.46g | | |
| | | 枳壳 | 芸香科植物酸橙 <i>Citrus aurantium</i> L. 及其栽培变种的干燥未成熟果实 | 生品 | 3.73g | | |
| | | 黄芩 | 唇形科植物黄芩 <i>Scutellaria baicalensis</i> Georgi 的干燥根 | 黄芩炭 | 3.73g | | |
| | | 槐角 | 豆科植物槐 <i>Sophora japonica</i> L. 的干燥成熟果实 | 槐角炭 | 11.19g | | |
| | | 地榆 | 蔷薇科植物地榆 <i>Sanguisorba officinalis</i> L. 或长叶地榆 <i>Sanguisorba officinalis</i> L. var. <i>longifolia</i> (Bert.) Yü et Li 的干燥根 | 地榆炭 | 7.46g | | |
| | | 荆芥炭 | 唇形科植物荆芥 <i>Schizonepeta tenuisfolia</i> Briq. 干燥地上部分的炮制加工品 | 荆芥炭 | 3.73g | | |
| | | 升麻 | 毛茛科升麻属植物大三叶升麻 | 生品 | 1.87g | | |

| | | | | | | | |
|----|--------------------------------------|-----|--|----|-------|--|--|
| | | | <i>Cimicifuga heracleifolia</i> Kom.、兴安升麻 <i>Cimicifuga dahurica</i> (Turcz.) Maxim.或 升麻 <i>Cimicifuga foetida</i> L.的干燥根茎 | | | | |
| | | 天花粉 | 葫芦科植物栝楼 <i>Trichosanthes kirilowii</i> Maxim. 或 双边栝楼 <i>Trichosanthes</i> <i>rosthornii</i> Harms 的干燥根 | 生品 | 2.98g | | |
| | | 甘草 | 豆科植物甘草 <i>Glycyrrhiza uralensis</i> Fisch.的干燥根和根茎 | 生品 | 1.87g | | |
| | | 侧柏叶 | 柏科植物侧柏 <i>Platycladus</i> <i>orientalis</i> (L.)Franco 的枝梢和叶 | 生品 | 7.46g | | |
| 备注 | 炒黄连：建议参考 2020 年版《中华人民共和国药典》中清炒法进行炮制。 | | | | | | |

注：由于剂型和煎煮法不同，表中各药折算剂量与备注中的日服量可能存在差异（由小数点进位导致），建议以备注中各药的日服量折算结果进行研发。