

## 附件4

中医外治类医疗服务价格项目及医保支付类别调整明细表

序号	项目代码	项目名称	项目内涵	内涵一次性卫生耗材	除外内容	计价单位	计价说明	三级(元)	二级(元)	一级(元)	医保支付类别
1	QHXZ0255	中药贴敷	由医务人员使用贴敷制品敷贴于体表特定部位或穴位,通过药物或物理作用,以发挥气血调和、阴阳平衡等各类作用。确定穴位,局部清洁,贴敷材料准备(含掺药、封包、冷热处理等),应用药物贴敷,处理用物等。			次	1、中药硬膏贴敷加收10%;2、中药贴敷(大),针对面积大于或等于5厘米×5厘米、小于10厘米×10厘米的治疗部位,加收40%;3、中药贴敷(特大),针对面积大于或等于10厘米×10厘米的治疗部位,加收50%;4、6周岁及以下儿童加收30%;5、中药热奄包按此收费;6、特殊材料贴敷按此收费。	46.00	39.00	33.00	甲类
2	QHXZ0256	中药吹粉	由医务人员将中药研粉吹至病变部位,以发挥消肿止痛等各类作用。局部清洁,调配药粉,吹粉,处理用物等。			次	6周岁及以下儿童加收30%。	27.00	23.00	20.00	乙类
3	QHXZ0257	中药烫熨	由医务人员将调配药物加热后置于患者体表特定部位或穴位,进行移动敷熨,以发挥散寒止痛、消肿祛瘀等各类作用。局部清洁,药物调配,移动敷熨,处理用物等。			次	1、中药烫熨(特大),针对面积大于或等于10厘米×10厘米的治疗部位加收10%;2、6周岁及以下儿童加收30%。	50.00	43.00	36.00	丙类
4	QHXZ0258	中药泡洗	由医务人员协助或指导患者,行全身或局部体位浸泡或淋洗,完成中药泡洗,以发挥温经散寒、活血化瘀、消肿、止痛、生肌等各类作用。局部清洁,药物调配,协助或指导,观察药液温度,处理用物等。			次	1、每日限收费2次;2、6周岁及以下儿童加收30%。	30.00	26.00	22.00	丙类
5	QHXZ0259	中药灌注	由医务人员将配制好的中药滴入或灌注并留置于人体腔道或窦道中,以促进疏通散瘀、去腐生肌等各类作用。局部清洁消毒,药物调配,材料准备,处理用物等。			次	6周岁及以下儿童加收30%。	36.00	31.00	26.00	甲类
6	QHXZ0260	中药湿渍	由医务人员将调配药物通过敷料的形式调温后湿敷于患处,以发挥治疗和促进药物吸收等各类作用。局部清洁,药物调配、蒸煮准备、湿渍治疗处理用物等。			次	1、中药湿渍(特大)针对面积大于10厘米×10厘米的治疗部位加收10%;2、6周岁及以下儿童加收30%。	42.00	36.00	30.00	乙类
7	QHXZ0261	中药涂擦	由医务人员将调配药物,制成水剂或膏剂或油剂等剂型的外用药物,直接涂擦于患者体表特定部位或穴位,以发挥促进活血化瘀、消炎止痛等各类作用。局部清洁,药物调配,各类手法涂擦,处理用物等。			次	1、中药涂擦(特大)针对面积大于10厘米×10厘米的治疗部位加收10%;2、6周岁及以下儿童加收30%。	37.00	31.00	26.00	甲类
8	QHXZ0262	中医熏洗	由医务人员选用制备好的药卷、药香或其他材料,点燃后直接用烟熏烤或蒸汽的形式,作用在患者身体某特定部位,以发挥疏通经络、促进药物吸收等各类作用。局部清洁,药物调配,熏(蒸)药,处理用物等。			次	1、6周岁及以下儿童加收30%;2、每日限收费2次。	40.00	34.00	29.00	乙类
9	QHXZ0263	中药腐蚀	由医务人员选用具有一定腐蚀作用的药物,敷涂患处,以蚀去恶肉、赘生物、肿物等,实现局部病变祛除,促使新肉生长。局部消毒,药物调配,腐蚀,包扎,处理用物等。			腐蚀位点/次	6周岁及以下儿童加收30%。	20.00	17.00	14.00	乙类

10	QHXZ0264	中药化腐清疮	由医务人员将化腐药物敷施于疮面，达到去腐生肌，促进疮面愈合的作用。药物调配，腐蚀，包扎，处理用物等。	注射器，培养管，冲洗液		疮面/次	1、6周岁及以下儿童加收30%； 2、深层化腐清创加收30%。	80.00	68.00	58.00	甲类
11	QHXZ0265	中医锐性清疮	由医务人员使用包括但不限于刀、剪、刮勺、钳等器械清除创面，发挥去腐生肌、促进疮面愈合的作用。药物调配，局部消毒，皮肤表层创面清理、使用器械清疮、敷药、包扎，处理用物等。			疮面/次	6周岁及以下儿童加收30%。	100.00	85.00	72.00	丙类
12	QHXZ0266	中医窦道(切开)搔爬	完成窦道(切开)搔爬，促进窦道闭合。局部消毒，探查浅表窦道，必要时切开，搔爬，处理用物等。	注射器，药纱条，凡士林纱条		每窦道/次	1、深层搔爬加收30%；2、耳前窦道加收50%；3、6周岁及以下儿童加收30%。	90.00	77.00	65.00	乙类
13	QHXZ0267	中医挑治	由医务人员使用针具，在特定部位或穴位上刺入、挑拨，以发挥调理气血、疏通经络、解除瘀滞等各类作用。确定部位，局部消毒，挑治，处理创口等。			挑治部位/次	6周岁及以下儿童加收30%。	60.00	51.00	43.00	甲类
14	QHXZ0268	中医割治	由医务人员选择部位或穴位，使用操作器具完成切割，以发挥经络疏通、毒邪外泄、缓解病痛等各类作用。确定部位，局部消毒，切割、包扎创口、处理用物等。			次	6周岁及以下儿童加收30%。	70.00	60.00	51.00	甲类
15	QHXZ0269	中医穴位放血治疗	由医务人员辨证使用器具刺(划)破特定穴位或部位，放出适量血液，以发挥活血祛瘀、排毒止痛等各类作用。使用各种工具，局部消毒，确定部位，放血，处理创口等。			次	1、甲床放血加收10%；2、刺络放血加收20%；3、6周岁及以下儿童加收30%。	50.00	43.00	37.00	甲类
16	QHXZ0270	中医药线引流	由医务人员使用不同材料加药品制作成线状物，插入引流口中，达到祛腐引流，促进疮口愈合的作用。流物制作、药物调配，局部消毒，疮口清理、放置引流物、必要时切开，局部包扎、处理用物等。			每引流口/次	6周岁及以下儿童加收30%。	100.00	85.00	72.00	乙类
17	QHXZ0271	中医刮痧	由医务人员通过刮痧器具和相应的手法，在体表进行反复刮动、摩擦，从而发挥促进活血透痧等各类作用。局部消毒，确定部位、刮拭、清洁，处理用物等。	刮痧油		次	6周岁及以下儿童加收30%。	40.00	34.00	29.00	乙类
18	QHXZ0272	砭石疗法	由医务人员使用砭石等同类功能的器具，通过各类手法作用在人体各部位，以发挥促进疏通经络、活血理气等各类作用。局部消毒，确定部位、运用点、压、揉、推、刮、擦等各类手法、清洁，处理用物等。			次	6周岁及以下儿童加收30%。	60.00	51.00	43.00	丙类
19	PBAA0101	贴敷治疗(小)	针对面积小于或等于5厘米×5厘米的治疗部位，根据治疗部位、颜色局部辨证，分为阴证、阳证、半阴半阳证，选择不同的贴敷剂。局部常规消毒，将选好的药物选配不同基质调和制备，敷于患处，若治疗部位红肿扩散应采用箍围贴敷。	换药包		部位		停用	停用	停用	甲类

20	PBAA0102	贴敷治疗(中)	针对面积大于5厘米×5厘米、小于或等于10厘米×10厘米的治疗部位,根据治疗部位、颜色局部辨证,分为阴证、阳证、半阴半阳证,选择不同的贴敷剂。局部常规消毒,将选好的药物选配不同基质调和制备,敷于患处,若治疗部位红肿扩散应采用箍围贴敷。	换药包		部位		停用	停用	停用	甲类
21	PBAA0103	贴敷治疗(大)	针对面积大于10厘米×10厘米、小于或等于15厘米×15厘米的治疗部位,根据治疗部位、颜色局部辨证,分为阴证、阳证、半阴半阳证,选择不同的贴敷剂。局部常规消毒,将选好的药物选配不同基质调和制备,敷于患处,若治疗部位红肿扩散应采用箍围贴敷。	换药包		部位		停用	停用	停用	甲类
22	PBAA0104	贴敷治疗(特大)	针对面积大于15厘米×15厘米的治疗部位,根据治疗部位、颜色局部辨证,分为阴证、阳证、半阴半阳证,选择不同的贴敷剂。局部常规消毒,将选好的药物选配不同基质调和制备,敷于患处,若治疗部位红肿扩散应采用箍围贴敷。	换药包		部位		停用	停用	停用	甲类
23	PBAA0201	中药涂擦治疗	辨证调配药物,局部清洁,用不同手法将中药药物涂擦于局部或穴位处。			次	大于10厘米×10厘米的治疗部位,加收50%	停用	停用	停用	甲类
24	PBAA0301	中药热奄包治疗(小)	针对面积小于或等于5厘米×5厘米的部位,辨证调配药物,将中药加热后,局部消毒,迅速用布包裹,敷于患部或穴位。			部位		停用	停用	停用	甲类
25	PBAA0302	中药热奄包治疗(中)	针对面积大于5厘米×5厘米、小于或等于10厘米×10厘米的部位,辨证调配药物,将中药加热后,局部消毒,迅速用布包裹,敷于患部或穴位。			部位		停用	停用	停用	甲类
26	PBAA0303	中药热奄包治疗(大)	针对面积大于10厘米×10厘米、小于或等于15厘米×15厘米的部位,辨证调配药物,将中药加热后,局部消毒,迅速用布包裹,敷于患部或穴位。			部位		停用	停用	停用	甲类
27	PBAA0304	中药热奄包治疗(特大)	针对面积大于15厘米×15厘米的部位,辨证调配药物,将中药加热后,局部消毒,迅速用布包裹,敷于患部或穴位。			部位		停用	停用	停用	甲类
28	PBAA0401	中药封包治疗(小)	针对面积小于或等于5厘米×5厘米的部位,辨证调配药物,局部清洁后,用中药均匀涂擦患处,然后用包膜包裹患处。			部位		停用	停用	停用	甲类
29	PBAA0402	中药封包治疗(中)	针对面积大于5厘米×5厘米、小于或等于10厘米×10厘米的部位,辨证调配药物,局部清洁后,用中药均匀涂擦患处,然后用包膜包裹患处。			部位		停用	停用	停用	甲类
30	PBAA0403	中药封包治疗(大)	针对面积大于10厘米×10厘米、小于或等于15厘米×15厘米的部位,辨证调配药物,局部清洁后,用中药均匀涂擦患处,然后用包膜包裹患处。			部位		停用	停用	停用	甲类
31	PBAA0404	中药封包治疗(特大)	针对面积大于15厘米×15厘米的部位,辨证调配药物,局部清洁后,用中药均匀涂擦患处,然后用包膜包裹患处。			部位		停用	停用	停用	甲类
32	PBAA0501	中药局部熏洗治疗	局部清洁,辨证调配药物,将中药药物加热,趁热先行熏蒸,适当温度时淋洗或浸泡。	塑料袋		次		停用	停用	停用	乙类
33	PBAA0502	中药半身熏洗治疗	半身清洁,辨证调配药物,将中药药物加热,趁热先行熏蒸,适当温度时淋洗或浸泡。	塑料袋		次		停用	停用	停用	乙类

34	PBAA0503	中药全身熏洗治疗	全身清洁,辨证调配药物,将中药药物加热,趁热先行熏蒸,适当温度时淋洗或浸泡。	塑料袋		次		停用	停用	停用	丙类
35	PBAA0601	中药蒸汽浴治疗	将辨证调配药物置入加热喷雾装置中,患者清洁后,坐入密闭的箱中,头部外露,启动开关。			次		停用	停用	停用	乙类
36	PBAA0701	中药塌渍治疗	局部清洁或常规消毒后,根据局部情况,辨证调配药物,使用不同剂型及温度,湿敷或泡洗。			次	大于10厘米×10厘米的治疗部位,加收50%	停用	停用	停用	乙类
37	PBAA0801	中药熏药治疗	局部清洁,辨证选用制备好的药卷、药香,或用特殊树枝,点燃后直接用烟熏烤,或放置在特定容器中用烟熏烤。	药卷,药香		10%体表面积		停用	停用	停用	乙类
38	PBAA0901	中药硬膏热贴敷治疗	辨证选择硬膏,局部清洁,将中药硬膏加热软化,调整厚薄大小,贴于患处。			部位		停用	停用	停用	乙类
39	PBAA1001	烫熨治疗(小)	针对面积小于或等于5厘米×5厘米的创面,辨证调配药物,将中药加热后,迅速用布包裹,然后在病人身上的特定部位来回移动或反复旋转按摩。			部位		停用	停用	停用	丙类
40	PBAA1002	烫熨治疗(中)	针对面积大于5厘米×5厘米、小于或等于10厘米×10厘米的创面,辨证调配药物,将中药加热后,迅速用布包裹,然后在病人身上的特定部位来回移动或反复旋转按摩。			部位		停用	停用	停用	丙类
41	PBAA1003	烫熨治疗(大)	针对面积大于10厘米×10厘米、小于或等于15厘米×15厘米的创面,辨证调配药物,将中药加热后,迅速用布包裹,然后在病人身上的特定部位来回移动或反复旋转按摩。			部位		停用	停用	停用	丙类
42	PBAA1004	烫熨治疗(特大)	针对面积大于15厘米×15厘米的创面,辨证调配药物,将中药加热后,迅速用布包裹,然后在病人身上的特定部位来回移动或反复旋转按摩。			部位		停用	停用	停用	丙类
43	PBAA1101	赘生物中药腐蚀治疗	局部常规消毒,用大胶布中央剪一与赘生物大小相同的孔并贴之,充分暴露赘生物,以保护周围皮肤,再将药物涂于赘生物表面,外敷敷料固定包扎。			每赘生物		停用	停用	停用	乙类
44	PBAA1201	中药化腐清创术(小)	针对面积小于或等于5厘米×5厘米的浅表创面。消毒铺巾,用生理冲洗液、中药液或中药油清洁创面,局部表面麻醉,视创面脓腐状况清除坏死组织及脓液,注意止血,取脓液行细菌培养及药敏试验,外敷中药,清洁包扎。不含细菌培养及药敏试验、超声清创、病理切片。	注射器,培养管,冲洗液		创面		停用	停用	停用	甲类
45	PBAA1202	中药化腐清创术(中)	针对面积大于5厘米×5厘米、小于或等于10厘米×10厘米的创面。消毒铺巾,局麻,清洁创面,用组织剪将坏死组织清除,取脓液行细菌培养+药敏试验,充分引流及止血,外敷中药,垫棉垫,清洁包扎,手术过程中注意勿损伤周围血管及神经。不含细菌培养及药敏试验、超声清创、病理切片。	注射器,培养管,冲洗液		创面		停用	停用	停用	甲类

46	PBAA1203	中药化腐清创术(大)	针对面积大于10厘米×10厘米、小于或等于15厘米×15厘米或侵及肌层的创面。消毒铺巾,局麻下用生理冲洗液冲洗创面,清除坏死皮痂、脓及腐肉,进行中医蚕食清疮,避免损伤健康组织与肉芽,取脓液行细菌培养及药敏试验,充分引流及止血,外敷中药,垫棉垫,清洁包扎,手术过程中注意勿损伤周围血管及神经。不含细菌培养及药敏试验、超声清创、病理切片。	注射器,培养管,冲洗液		创面		停用	停用	停用	甲类
47	PBAA1204	中药化腐清创术(特大)	针对面积大于15厘米×15厘米或侵及骨、关节囊、肌腱、神经、血管,包括颈部及会阴部的创面。消毒铺巾,在手术室行对应的麻醉下,用生理冲洗液冲洗创面,清除坏死皮痂及痂下积脓,暴露坏死组织,进行中医蚕食清疮,避免损伤健康组织,若坏死组织侵犯到骨、关节囊、肌腱,也应一并切除,用咬骨钳清除坏死骨面或骨残端,取脓液行细菌培养+药敏试验,充分引流,创面用激光刀或氩气刀止血,外敷中药,垫棉垫,清洁包扎,手术过程中注意勿损伤周围血管、神经及正常骨面。不含细菌培养,药敏试验,激光刀、氩气刀、超声清创或病理切片。	注射器,培养管,冲洗液	止血材料	创面		停用	停用	停用	甲类
48	PBAA1301	挑治	病人坐位,局部常规消毒,用消毒三棱针将挑治部位的表皮纵行挑破0.2-0.3厘米,然后深入表皮下,将皮层白色纤维样物全部挑断,或剪去,或把挑出的纤维弹拨几下,以增加刺激,伤口一般无出血或稍有出血,然后用消毒液消毒,外覆纱布并固定。	注射器		穴位		停用	停用	停用	甲类
49	PBAA1401	甲床放血治疗	常规消毒,将针具烧红后快速刺透甲板,放净瘀血,清洁包扎。			每甲		停用	停用	停用	甲类
50	PBAA1501	药线引流治疗	采用桑皮纸或丝绵纸,将纸裁成宽窄、长短不同的纸条,一种方法是先将纸条捻搓,再对折,如搓麻绳般搓成纸线,涂凡士林后并滚上已配制的药粉,另一种方法是在搓药线前,将已配制好的药粉撒于纸条中,以上制成的药线,经常规消毒后备用,操作时窦道口周边清洁消毒,用探针探及窦道深浅及宽窄,辨证选择合适的药线,插于窦道底,再上提0.1-0.2厘米,将长于窦道口的药线平折于窦口外,外敷药物并固定。	药线		每窦道		停用	停用	停用	乙类
51	PBAA1601	体表窦道切开搔爬术	消毒铺巾,局麻下,用探针由窦口插入,探查窦道,沿探针走行切开,将腐烂肉芽组织搔爬干净,并切除坚硬窦壁,填以中药纱条或凡士林纱条,外敷无菌纱布及棉垫包扎固定。	注射器,药纱条,凡士林纱条		每窦道	每增加1个分支窦道加收不超过50%	停用	停用	停用	乙类

52	PBAA1602	耳前窦道切开搔爬术	消毒铺巾,局麻下,用探针由耳前窦口插入,注入2%亚甲蓝液充盈窦道各分支,在瘻管口周围作梭形切口,切开皮肤及皮下组织后,沿蓝染的管道仔细分离,将腐烂肉芽组织搔爬干净,充分止血,填以中药纱条或凡士林纱条,外加纱布覆盖,加压包扎固定。	注射器,药纱条,凡士林纱条		每窦道	每增加1个分支窦道加收不超过50%	停用	停用	停用	乙类
53	PBAA1603	乳腺窦道切开搔爬术	消毒铺巾,局麻下,以探针探查窦道,沿探针将窦道切开,将窦道两边的窦壁切除直至正常组织。生理冲洗液冲洗伤口,止血,填以中药纱条或凡士林纱条,外敷无菌纱布及棉垫包扎固定。	注射器,药纱条,凡士林纱条,冲洗液		每窦道	每增加1个分支窦道加收不超过50%	停用	停用	停用	乙类
54	PBCD0301	穴位注射治疗	根据病情,确定穴位,选择药物及浓度、注射器和注射针型号,确定准确的进针位置,皮肤常规消毒后进行注射,针头刺入穴位得气后,回抽针芯,无回血、无回液即注入一定量的药物,在注射过程中要密切观察患者的反应。	注射器		每穴位		停用	停用	停用	甲类
55	PBCD0401	穴位贴敷治疗	选择适宜的中药,并对药物进行中药饮片调配临方复杂炮制,选择贴敷方法,将制备好的药物贴敷于穴位,贴敷一定的时间,密切观察贴敷后皮肤的变化。			每穴位		停用	停用	停用	甲类
56	PBCD1001	割治	将割治部位皮肤严格消毒,局部麻醉,用小手术刀划割约0.5-1厘米的小切口,挑出或挤出少量皮下脂肪并剪去,之后可用止血钳在切口内适当划动刺激,使患者局部出现酸、麻、胀感,消毒包扎止血。	注射器		部位	计价最多不超过3个部位	停用	停用	停用	乙类
57	PBCD1501	砭石治疗	根据病情确定施术部位,选择砭石用具,确定施术方法和治疗时间,治疗手法有感、压、滚、擦、刺、划、叩、刮、扭、旋、振、拔、温、凉、闻、挝等。			次		停用	停用	停用	丙类
58	PBFA0501	耳部吹药治疗	调配药粉,用3%双氧水、卷棉子清洁创面,外耳疾病:使用吹粉器将药粉吹至外耳道或耳廓皮肤表面,中耳疾病:使用吹粉器将药粉吹至鼓室或鼓膜表面。			单侧		停用	停用	停用	乙类
59	PBFA0502	咽部吹药治疗	调配药粉,用压舌板,暴露病变部位,使用吹粉器将药粉吹至口腔、扁桃体、咽后壁等部位。			次		停用	停用	停用	乙类
60	PBFA0901	刮痧治疗	根据病情确定施术部位,选择刮痧用具,确定刮痧方法,在皮肤涂以润滑剂,用适宜的力度,沿一定的方向进行刮拭,刮至皮肤出痧为止。	刮痧油		部位	超过3个部位按3个部位收费	停用	停用	停用	乙类
61	PBFA1001	经直肠中药滴入治疗	肛门局部消毒,插入肛管,并连接灌肠袋,缓慢滴入治疗药物。	注射器,肛管,灌肠装置		次		停用	停用	停用	甲类